

Aus dem Johanniterkrankenhause (Friedrich-Wilhelmstift)
zu Bonn

Die Webster-Baldy'sche Operation,
ihre Erfolge und Mißerfolge
auf Grund des Materials am Johanniterkrankenhaus

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doktorwürde
der
Hohen Medizinischen Fakultät
der
Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität
zu Bonn

Vorgelegt am 17. November 1936 von
Kurt Gustav-Adolf Müll
aus Iserlohn in Westfalen

Bonn 1937
Buchdruckerei Joseph Heidelbergmann

Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Bonn

Referent: Prof. Dr. C r a m e r

Korreferent: Prof. Dr. S i e b k e



Meinen lieben Eltern
in Dankbarkeit gewidmet!



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41552322_0018

Wenn man die Fachliteratur der letzten Jahre durchsucht nach Veröffentlichungen über Operationen, die der Korrektur falscher Uteruslagen dienen sollen, so kann man feststellen, daß sie außerordentlich spärlich sind. Und doch war gerade dieses Thema in dem Zeitraum von der Jahrhundertwende an bis in die Zeit des Weltkrieges hinein eines der meist behandelten und auch am heftigsten umstrittenen in der ganzen Gynäkologie.

Naturgemäß nahm die Abweichung des Uterus aus der normalen Lage nach hinten als die am häufigsten auftretende Lageanomalie auch den breitesten Raum in diesen Diskussionen ein. Bei den Rückwärtsverlagerungen unterscheiden wir im Wesentlichen drei Formen, je nachdem der Uterus in seiner Gesamtheit oder nur zum Teil nach hinten verlagert ist: die Retropositio, die Retroversio und die Retroflexio.

Retropositio nennt man die Verlagerung dann, wenn der Uterus — ohne seine Gestalt zu verändern — im Beckenraum nach hinten verschoben ist. Diese Form der Uterusdeviation sei hier vernachlässigt, da sie selten vorkommt, meist wegen ihrer Symptomlosigkeit nur ein Gelegenheitsbefund ist und deshalb keiner Therapie bedarf.

Normalerweise befindet sich der Uterus in einer Lage und Form, die wir als antevertiert-anteflektiert bezeichnen. Dabei versteht man unter Version die Stellung des Gesamterus, genauer gesagt, der Achse des Canalis cervicalis zur Vagina und unter Flexion die Stellung der Corpusfundusachse zur Cervixachse.

Anteversion bedeutet mithin, daß die Achse des Cervikalkanales mit der Scheidenachse einen stumpfen, nach vorn offenen Winkel bildet.

Von Retroversio uteri (R.V.) spricht man dann, wenn dieser Winkel größer wird und mit der Scheidenachse zusammenfällt oder sogar einen nach hinten offenen Winkel bildet. Bei bestehender R.V. kommt es leicht zum Descensus oder Prolapsus uteri.

Die Biegung, die die Uterusachse beim Übergang des cervicalen Anteiles in den Corpusteil aufweist, wird als Flexion bezeichnet; normalerweise findet sich eine Anteflexion, d. h. eine nach vorn offene, stumpfwinklige Beugung. Wird der Winkel ein spitzer, spricht man von Anteflexio im pathologischen Sinne; dieser Zustand ist meist eine Verdrängungserscheinung durch Tumoren oder aber in den meisten Fällen eine Erscheinung bei Infantilismus. Die spitz-

winklige Anteflexio muß im Rahmen dieser Arbeit nur deshalb erwähnt werden, weil sie manchmal mit Retroflexio gepaart sein kann, d. h., der Uterus ist einmal retroflektiert und bei der nächsten Untersuchung wieder anflektiert. Es wird diese scharniergelenkähnliche Beweglichkeit des Uterus zurückgeführt entweder auf primäre Schwäche des Corpus-Cervixknies oder auf sekundäre durch Druckatrophie. Auch unter unseren operierten Fällen fanden sich solche, bei denen Retroflexio mit Anteflexio abwechselte, und die — das sei vorweggenommen — ausnahmslos geheilt wurden.

Geht der Corpus-Cervixwinkel jedoch in einen gestreckten oder in einen nach hinten offenen Winkel über, so haben wir die Retroflexio uteri (R.F.) vor uns. Während bei der R.V. eine Lageveränderung des Uterus vorliegt, handelt es sich bei der typischen R.F. um eine reine Formveränderung des Uterus (Opitz, Halban). Wenn hier auch anatomisch zwei grundverschiedene Tatsachen vorliegen, so sind jedoch das klinische Bild und die Therapie weitgehend übereinstimmend, so daß wir — was diese beiden Punkte anlangt — die anatomische Differenz in dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigen brauchen.

Als „Uterus in mittlerer Streckstellung“ bezeichnet man diejenige Stellung, bei der der ganze Uterus gestreckt ist (nach unserer Definition also leicht retroflektiert), und außerdem die Uterusachse mit der Scheidenachse zusammenfällt (Retroversion). Eine Sonderbezeichnung dieser kombinierten Lage-Formanomalie ist deswegen zweckmäßig, weil sie direkt als Disposition und Vorstufe des Descensus bzw. Prolapsus uteri aufgefaßt werden kann. Sie kommt vorübergehend auch bei der puerperalen Rückbildung des Uterus zustande.

Nach unserer Definition kann es — wie ja auch die Praxis zeigt — sehr wohl zu einer R.F. kommen, ohne daß eine R.V. vorzuliegen braucht. Wir finden auch eine R.V. bei anteflektiertem Uterus, eine Tatsache, die der von v. Jaschke im Stöckel'schen Handbuch gegebenen Definition widerspricht, da nach seiner Meinung zur R.V. ein nahezu gestreckter Uterus gefordert wird.

In der Tat ist die R.F. sehr oft mit einer R.V. kombiniert, ja, man kann fast sagen, daß eine extreme R.F., d. h. eine solche, bei der der Fundus uteri tief im Cavum Douglasi liegt, nur bei gleichzeitig bestehender R.V. zustande kommen kann. Trotzdem ist es unrichtig, zum Begriff der R.V., einer Lageveränderung, gleichzeitig einen gestreckten Uterus, eine Formveränderung, als Voraussetzung zu verlangen. In den allerdings zahlreichen Fällen von R.V. mit gleichzeitiger R.F. sprechen wir dann von einer Retroversioflexio (R.V.F.).

Es sei hier noch angeführt, daß man früher vor den Untersuchungen durch B. S. Schultze die R.V.F. sogar für die physiologische Form und Lage des Uterus gehalten hat, weil man bei Sektionen sehr oft diese Veränderung vorfindet. Diese Abweichung vom Normalen in cadavere ist nicht etwa auf einen postmortalen Tonusverlust der Organe zurückzuführen, sondern dadurch zu erklären, daß man bei der Darstellung des Situs die den Uterus stützenden Darmkonvolute aus dem Douglas'schen Raume zieht; bei der gefrorenen Leiche bleiben nämlich die normalen Verhältnisse erhalten (Opitz, Halban). Wahrscheinlich ist auf diesen Sektionsbefund sogar die Bezeichnung „fundus uteri“ zurückzuführen, d. h. Grund, tiefst liegender Teil.

Für die Ergründung der Ätiologie wie auch für den Gang der Therapie ist es von grundlegender Bedeutung, drei Arten der R.V.F. zu unterscheiden: die R.V.F. mobilis, die R.V.F. fixata und die R.V.F. incarcerata.

Als R.F. mobilis bezeichnet man die Gebärmutterknickung, solange sie manuell aufrichtbar ist. Aber auch eine R.F. mobilis läßt sich oft nur in Narkose und auch dann erst durch die Anwendung der kombinierten Handgriffe nach Schultze aufrichten. Fixiert ist eine R.F. dann, wenn sie durch Adhäsionen in ihrer Lage gehalten wird und gar nicht oder nur zum Teil aufrichtbar ist. Auf die Genese der Adhäsionen werde ich weiter unten noch zurückkommen. Natürlich ist auch die durch einen Tumor verursachte R.F. zu den fixierten zu rechnen, zu deren Beseitigung der Tumor entfernt werden muß.

Von einer R.V.F. incarcerata endlich spricht man dann, wenn eine Aufrichtung vollkommen unmöglich ist, auch wenn trotzdem keinerlei Verwachsungen oder Verdrängungen vorhanden sind, und sich der Uterus bei eröffneter Bauchhöhle spielend leicht aufrichten läßt. Wir finden diese Form der R.V.F. besonders oft bei tiefem, spornförmigem Douglas, in den der total retrovertiertflecktierte Uterus hineingelitten ist. Die Dynamik dieser Incarceration hat Cramer näher erklärt. Der Peritonealüberzug des Uterus liegt dem Douglasperitoneum capillär auf. Die Incarceration ist also bewirkt durch Capillarattraktion bzw. durch den atmosphärischen Druck. Der Druck bzw. Sog, der auf den incarcerierten Uterus einwirkt, ist so stark, daß dies Organ oft vollkommen die Form des Douglasspornes annimmt. Eine gewaltsame Aufrichtung des Uterus ist nicht möglich. Will man diesem Zustand nicht radikal durch eine Operation abhelfen, wie dies z. B. der Fall ist bei der R.F. incarcerata uteri gravidi mit Rücksicht auf die Gefährdung

der Gravidität, so wurde für diese Fälle eine ebenso einfache wie wirkfame Therapie angegeben. Man ging von der Idee aus, den capillären Douglaspalt zu erweitern, und damit die Capillarattraktion aufzuheben. Durch längere Knieellenbogen-, Seiten- und Bauchlage erreicht man es auch, daß sich einige Darmfchlingen in den Douglas herabfenken, und sich die R.F. incarcerata fpontan behebt; hat der Uterus im weiteren Verlaufe der Schwangerschaft erft das kleine Becken verlassen und ift über das Promontorium hinausgewachfen, ift die Gefahr einer neuerlichen Incarceration behoben, wenigftens fo lange, wie die Gravidität befeht. Bei einem etwaigen Recidiv poft partum kann die operative Antefixation unter wefentlich günstigeren Bedingungen und ohne Gefährdung der Schwangerschaft ausgeführt werden.

Früher war man gewohnt, die genitalen Lageanomalien vollkommen ifoliert zu betrachten. Das war eine Folge davon, daß man irrthümlicherweise die Körperform als ein ftatifche Größe anjah, die fich immer gleich blieb, und mit der man infolgedeffen beftimmt rechnen konnte. In Wirklichkeit haben wir es aber mit einer einheitlichen Beckenbauchhöhle zu tun mit gegenfeitiger Wirkung von Wand und Inhalt (v. J a f c h k e). Funktionell betrachtet ift fie als ein Aggregat zu bezeichnen, deffen Wand die Fähigkeit eines veränderlichen Tonus und deffen Inhalt die Fähigkeit eines veränderlichen Turgors hat (S e l l h e i m).

Gerade diefe beiden Eigenfchaften eines veränderlichen Tonus und Turgors bewirken den engen Aneinanderfchluß von Wand und Inhalt und zwar, wie S e l l h e i m fich ausdrückt, auf aero-hydraulifcher Grundlage. Diefe Dynamik erklärt auch, daß es eine eigentlich „freie“ Bauchhöhle gar nicht gibt, daß vielmehr fämtliche Eingeweide capillär aneinander und ihrerfeits wieder capillär der Rumpfwand anliegen. S e l l h e i m prägte für diefes System von wechfelnden Bewegungen den Ausdruck „Tonus-Turgorspiel“, das in feiner Gefamtheit den Bauchdruck beftimmt. Selbstverftändlich laftet beim Menfchen infolge der Orthofkelie der größte Abdominaldruck auf dem Beckenboden. Er und die ihm benachbarten Organe find fomit bei aufrechter Stellung dem ftärkften Abdominaldruck ausgefetzt alfo auch der Uterus. Der Druck wird geftiegt oder herabgefetzt durch das ununterbrochene Spiel in der phyfiologifchen Wirkfamkeit der Abdominalwände und durch den fich kontinuierlich ändernden Inhaltsdruck des Eingeweidepaketes. Diefe Schwankungen fetzen fich alfo regelmäßig auf den Uterus fort und beeinflussen in ihrer Gefamtheit die Pofitio uteri. Der Bauchdruck ift alfo jene Kraft, die den Uterus aus feiner Pofitio zu drängen fucht. (T a n d l e r verfteht in diefem Zusammenhang unter Pofitio

uteri den Uterus in Gleichgewichtslage in cranio-caudaler Richtung.) Soll trotzdem der Uterus in dieser seiner Gleichgewichtslage gehalten werden, so muß hier die Wirkung einer Gegenkraft einsetzen. Dies wiederum kann nur durch Fixationsmittel erfolgen. Analysiert man anatomisch diese Befestigungsmittel, so ergeben sich theoretisch zwei Möglichkeiten in der Art der Fixation: 1. der Uterus ist in feinen Bändern aufgehängt; das System der Ligamente würde also als Suspenforium uteri fungieren. 2. Der Uterus liegt mit seinem Gewicht dem Beckenboden auf; dieser würde also dem Uterus als Stützapparat dienen (T a n d l e r).

Eine Lageanomalie der Genitalien speziell des Uterus wurde früher ausschließlich auf ein Versagen der „Aufhängevorrichtung“ zurückgeführt. Auf Grund dieser Meinung entwickelte sich auch eine Reihe von Operationsmethoden, die einen Descensus, eine R.F. usw. heilen sollten. Ein großer Teil dieser an den Bändern angreifenden Operationen erfüllte in der Tat den gewünschten Zweck; allerdings kam das nicht durch die Verkürzung der Bänder an sich, damit sie den Uterus etwa besser tragen könnten, sondern — wie wir später sehen werden — nur dadurch, daß man den intraabdominellen Druck in eine andere, wieder normale Angriffsrichtung zum Uterus brachte.

Schon S e l l h e i m bewies durch Versuche am toten Organismus die totale Insuffizienz der sogenannten Aufhängebänder der Eingeweide. Der sie zusammenhaltenden Bauchdecken beraubt, sanken die Eingeweide dank der sich enorm dehnenden Aufhängebänder tief herab. Wenn auch zugegeben werden muß, daß im lebenden Organismus die Bänder fraglos eine größere Zugfestigkeit aufweisen, so sind sie aber immer noch zu elastisch, um ernsthaft als Aufhängevorrichtung angesehen zu werden. Eine gewisse Bedeutung für eine solche Funktion käme allenfalls den mit tonusbegabter Muskulatur ausgestatteten Bändern zu. Betrachten wir uns unter diesem Gesichtspunkt die „Hauptsusensionsmittel“ des Uterus, das Ligamentum latum, das Ligamentum rotundum und das Ligamentum sacrouterinum!

Das Lig. latum kann man unterteilen in das Lig. latum im engeren Sinne unterhalb des Ligamentum ovarium proprium und die Mesosalpinx. Beide sind vollkommen frei von Muskulatur. Wenn sich auch im Lig. cardinale (nach M a c k e n r o t h das Lig. transversum colli), das die Basis des Lig. latum bildet, schwache Muskelzüge nachweisen lassen, so dient es doch offensichtlich nur als Träger der Vasa uterina (C o r n i n g). Das Lig. rotundum (Lig. rot.) besteht neben dem bindegewebigen Anteil hauptsächlich aus

glatter Muskulatur und wenigen quergestreiften Muskelfasern. Gegen seine Fähigkeit, als Aufhängevorrichtung zu dienen oder gar den Uterus aktiv zu anteflektieren, spricht die Tatsache, daß es sowohl in cadavere als auch in vivo stets als bogenförmiges und völlig entspanntes Band befunden wird. Das Lig. sacrouterium mit seiner minimalen Muskulatur ist erst recht nicht imstande, den Uterus zu halten oder das Collum uteri rückwärts zu ziehen (Tandler).

Diese Tatsachen ergeben einwandfrei, daß die Bänder den Uterus nicht tragen. So, wie die Baueingeweide durch die Bauchmuskulatur in ihrer Lage gehalten werden und nicht etwa durch das Gekröse, wird auch der Uterus durch den Beckenboden, speziell durch den Levator ani, gestützt und nicht durch seine Bänder suspendiert. Den Beweis für diese Behauptung bringt uns die Pathologie. Wird der M. Levator ani mechanisch geschädigt, so tritt meist eine krankhafte Verlagerung des Uterus ein. Besonders kommt es zu R.V., R.F., Descensus und Prolaps. Eine mechanische Schädigung kommt meist durch ein Geburtstrauma zustande; vielleicht gehört auch das Zustandekommen einer traumatischen R.F. hierher. Hypotonie des Levator führt zu denselben Folgen wie die Zerreißung. Eine Erweiterung des Hiatus genitalis disponiert zur Hiatushernie. Nervös-trophische Störungen zentraler oder peripherer Art der Beckenbodenmuskulatur z. B. durch Rückenmarksläsionen ziehen eine R.F. oder einen Descensus nach sich. Interessant ist in diesem Zusammenhang das gehäufte Auftreten von R.F. und Descensus bei der Spina bifida, auch bei der Spina bifida occulta.

Wer hält nun den Uterus in der von uns als normal bezeichneten Anteversioflexio? Der Abdominaldruck hat auf die Lage und Form des Uterus nur soweit Einfluß, als er die jeweilige Versioflexio erhält resp. verstärkt, also auch die R.F.V.

Bis heute glauben noch die meisten Autoren, daß die Ligamente die Fixierung besorgen. Das außerordentlich dehnbare und schlaffe Peritoneum kommt für diese Aufgabe nicht in Frage. Das Lig. sacrouterium, welches man als Retractor cervicis uteri auffaßte (Luschka), kann die Funktion der Fixierung des Uterus nicht übernehmen, da 1.) der Uterus sich nicht — wie früher angenommen wurde — um die sog. Aran'sche Achse dreht, die in der Höhe des inneren Muttermundes gedacht ist; eine solche Drehung wäre ja nur möglich, wenn er suspendiert wäre. Oben haben wir aber festgestellt, daß der Uterus gestützt wird; aus diesem Grunde kann er auch nur seine Unterlage als Drehpunkt benutzen. Er liegt aber mit der Portio der Scheide auf und dadurch mittelbar dem Beckenboden. 2.) Setzen die spärlichen Muskelfasern des Lig. sacrouterium nicht einmal unterhalb des Orificium uteri internum an, son-

dern fäfern sich nachweislich noch bis zur Höhe des Corpus uteri hin auf. Das Lig. rot. bleibt auch bei maximaler Retroflexion völlig schlaff (T a n d l e r). Die Vorstellung, daß das Lig. rot. die Antelexio erhalte, war die theoretische Grundlage für die Operationsverfahren von A l e x a n d e r - A d a m s und anderen.

Die Bänder allein können also den Uterus nicht in seiner Lage erhalten. Ihre Aufgabe erwächst den Ligamenten erst unter der Geburt. Der Innervierung und Ernährung nach gehört die Muskulatur der Bänder zur Uterusmuskulatur. Infolgedessen hypertrophieren sie während der Gravidität auf Fingerdicke. Während der Gecranio-caudaler Richtung, d. h., sie verhindern eine cranialwärts burt stützen sie — insbesondere die Ligg. rott. — den Uterus in gerichtete Verschiebung des Fundus.

Die Positio uteri wird durch den Beckenboden gehalten (die Positio im Sinne T a n d l e r s). Die Anteversio wird erhalten durch den auf die hintere Corpuswand einwirkenden Abdominaldruck. Die Anteflexio wird garantiert durch den Eigentonus dieses Organes. Der Uterus ist phylogenetisch und ontogenetisch zur Anteversioflexio disponiert (T a n d l e r).

Diese prinzipiellen Sätze befragen anders ausgedrückt: Die normale Lage und Form des Uterus sind abhängig von folgenden Faktoren: der Elastizität des Uterusgewebes, der Integrität der Beckenboden(Bauchdecken-)muskulatur, der unge störten Funktion der Blasenmuskulatur und (nach v. J a f c h k e) zuletzt noch von der Integrität des Zügelapparates der Ligg. rott.; letztere sollen aber nur bei excessiv stark gefüllter Blase in Tätigkeit treten, wie überhaupt dem Bandapparat von manchen Autoren eine — wenn auch geringe — kompensatorische Fähigkeit für kurze Zeit zugesprochen wird, falls einer der oben genannten Faktoren ausfallen sollte.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wird der Uterus immer wieder in seine Normallage zurückgebracht. Jede über die normale Exkursionsbreite hinausgehende Lageveränderung ist nur möglich bei einer abnormen Beweglichkeit des inneren Genitale. Diese abnorme Beweglichkeit aber hat ihren wesentlichen Grund in einer Störung des Tonus des Beckenbodens oder einer Herabsetzung des Uterustonus selbst. Aber gerade der Eigentonus des Uterus zusammen mit der vis a tergo nachdrängenden Eingeweidedäule bewirkt, daß der Uterus auch während der Blasenentleerung keinen Moment den Anschluß an die Blase verliert (v. J a f c h k e).

Die Erhaltung des capillären Anschlusses des Uterus an die Blase ist aber unumgänglich dazu nötig, daß sich der Bauchdruck nur auf die Hinterfläche des Uterus auswirken kann. Die vordere

Uterusfläche kann dem Bauchdruck nur zugänglich werden, wenn Darm in die gewöhnlich darmfreie Excavatio vesico-uterina eindringt und auf Grund der senkrechten Druckeinwirkung auf den Uterus diesen eleviert und sogar retroflektiert (v. J a f c h k e). Klaffen der Excavatio vesico-uterina und R.V. stehen demnach in einem ätiologischen Verhältnis zueinander. Die Erhaltung dieses capillären Spaltes ist daher Voraussetzung für das Bestehenbleiben der Anteversio. Diesen capillären Spalt kann man gegebenenfalls operativ erstreben; in diesem Prinzip liegt auch der Erfolg der betreffenden Operationen begründet und nicht etwa darin, daß man die Bänder durch Verkürzung tragfähiger macht.

Wodurch und unter welchen Bedingungen kann aber Darm in die Excavatio vesico-uterina eindringen? Das ist nur möglich, wenn sich der normalerweise capilläre Spalt zwischen Uterus und Blase erweitert; dies tritt ein, wenn das Spiel der physiologischen Lage-schwankungen des Uterus, die durch Füllung oder Entleerung der Nachbarorgane bedingt sind, dahingehend gestört ist, daß der Uterus seine Ausgangslage nicht schnell genug wieder einnimmt, wenn z. B. bei der Entleerung der stark gefüllten Blase der Uterus der zurückweichenden Blase „nachhinkt“ anstatt ihr capillär aufliegend zu folgen. Das unmittelbare Nachfolgen des Uterus bei Kontraktion der Blase wird aber nach den vorhergehenden Erklärungen durch den Uteruseigentonus garantiert.

Unter physiologischen Verhältnissen tritt eine starke Tonusverminderung des Uterus im Anschluß an eine Geburt ein. In der Tat haben wir hier oft Gelegenheit, die Entstehung einer R.F. direkt durch den Taftbefund zu verfolgen. Als die eine R.F. begünstigenden Momente kommen noch hinzu, daß man — besonders früher — die Wöchnerin während der puerperalen Rückbildung eine langdauernde, strenge Rückenlage einhalten ließ, und daß ferner die Blasenentleerung der Wöchnerin nur unter vermehrter Zuhilfenahme der Bauchpresse möglich ist. Eine puerperale Entstehung der R.F.V. läßt sich also leicht erklären und ist tatsächlich bei sehr sorgfältiger Beobachtung auf circa 3% geschätzt worden (v a n d e r H o e v e n , v. J a f c h k e). Unter unserem eigenen Material können wir in 3,3% der Fälle das Puerperium für die Genese verantwortlich machen; diese Behauptung wird gestützt z. T. durch Untersuchungen, die vor der Schwangerschaft stattgefunden hatten, zum andern Teil sahen wir uns aber berechtigt, die puerperale Genese anzunehmen, da die Patientinnen uns spontan angaben, ihre Beschwerden seien unmittelbar im Anschluß an ein Wochenbett entstanden. Eine andere Patientin fühlte ihre Beschwerden seit einem durchgemachten Puerperalfieber. Bei zwei weiteren Patien-

tinnen hatten die Krankheitsercheinungen im Anschluß an einen stattgehabten Abort eingesetzt. Von zwei Patientinnen erfuhren wir, daß ihre Beschwerden seit einer Zangenentbindung datierten. Es entzieht sich unserer Kenntnis, ob in den beiden letzten Fällen die R.F. rein puerperal entstanden ist, ob nicht eine eventuell subkutane Dammschädigung gesetzt wurde, oder ob nicht eine Geburtsverletzung zu einer Fixation der Portio an die vordere Scheidenwand geführt, den Uterus dadurch in Reclinations-(Retroversions-)stellung gezogen und somit die Entstehung der R.F. begünstigt hat. Bei diesen 15 Patientinnen kann man also mit Sicherheit die Geburt bzw. Fehlgeburt als Entstehungsursache annehmen. An unserem Material beträgt der Anteil der durch Geburt, Fehlgeburt oder Wochenbett entstandenen Retroflexionen somit im Ganzen 4,9% (vgl. die Krankengeschichten Nr. 1—6).

Betrachtet man diese relativ kleine Zahl und berücksichtigt man, daß aus der Anzahl unserer Fälle nur ungefähr ein Drittel der Frauen eine Geburt gehabt hatten (die Zahl der Aborte läßt sich begreiflicherweise nicht ergründen), so ist es klar, daß für den Großteil der Retroflexionen andere Gründe vorhanden sein müssen. Die congenitale R.F. schließt sich selbst aus, da bisher nur zwei Fälle einwandfrei nachgewiesen wurden (R u g e, G r e u f e r). Ein Teil der R.F. läßt sich fraglos auf eine genitale Entwicklungshemmung zurückführen. Auf der einen Seite kann eine zu kurze Scheide im Zusammenwirken mit einer meist bei genitaler Hypoplasie auffallend langen Portio vaginalis den Uterus in Retroversionsstellung bringen und damit zur R.F. disponieren. Auf der anderen Seite ist aber der verminderte Tonus eines kleinen, dünnwandigen, hypoplastischen Uterus wohl von ausschlaggebender Bedeutung, zumal in solchen Fällen der Antelexionswinkel nur wenig ausgeprägt ist.

Es ist ferner erwiesen, daß sich häufig nach erschöpfenden Krankheiten eine R.F. bildet. Auch wir konnten in einigen Fällen diesen Grund einwandfrei anamnestisch feststellen. Es leuchtet auch ohne weiteres ein, daß im Verlaufe einer langen, schwächenden Krankheit auch der Uterus samt seiner muskulären Unterlage, dem Beckenboden, in Mitleidenschaft gezogen wird und seinen normalen Tonus einbüßt. Begünstigend auf die Entstehung einer R.F. wirkt auch wohl die in Rückenlage erschwerte Miktion und die bei längerer Bettruhe nicht ausbleibende Obstipation (F r i t s c h).

Zu einer Lageveränderung kommt es unter den oben geschilderten Umständen sehr leicht. Dann ist es aber auch nur noch ein kleiner Schritt zur Gestaltsveränderung, besonders bei erschlafftem Uterus. Die Formveränderung bewirkt der Bauchdruck, der den Uterus so weit nach hinten drückt, bis dieser auf einen Widerstand

stößt, der ihm durch den Beckenboden geboten wird. Da nun der Beckenboden keine ebene Fläche ist, sondern gerade im Bereiche der Levatorplatte eine nach hinten offene, konkave Mulde darstellt, so werden auch die einzelnen Teile des Uterus auf verschiedenen Widerstand stoßen und auch entsprechend weit nach hinten getrieben. Da der Uterus ein plastisches Organ ist, wird er sich der Form seiner Unterlage weitgehend anpassen, und wird sich so seine definitive Form schließlich nach der seiner Unterlage richten. Liegt er in der Kreuzbeinhöhle, so bleibt seine Streckstellung gewöhnlich bestehen, sinkt er dagegen tiefer, so daß die Cervix über die konvexe Curvatura perinealis zu liegen kommt, so wird der Körper in die Levatormulde gepreßt, und der ganze Uterus nimmt die für die R.F. typische Form an (Halban, Menge, Opitz). Erleichtert, wenn nicht gar erst ermöglicht, wird diese Umformung des Uterus — wie schon gesagt — bei einer primären oder sekundären Muskelschwäche des Uterus.

Besonders bei Virgines und Nullipara ist ein häufiger Grund für eine R.V.F. zu suchen in einer primären, konstitutionellen Minderwertigkeit der gesamten Binde- und Stützgewebe, der Asthenia universalis congenita (Stiller) oder in der sogenannten „schlaffen Faßer“ (v. Jaschke). Wir finden bei diesen Frauen eine allgemeine Enteroptose, als deren Teilerscheinung dann die R.V.F. anzusehen ist. Dieser primären kann man eine sekundäre Faßererschaffung gegenüberstellen, die zustande kommt durch Häufung von Schwangerschaften ohne genügende Pausen und Schonung besonders, wenn noch eine Beckenbodenläsion hinzukommt. Diese sekundäre Faßererschaffung kann auch bei sonst gefunden Frauen eintreten (Sellheim).

Betrachten wir nun, diese verschiedenen Entstehungsursachen einer R.V.F., ob puerperal, auf hypoplastischer oder marastischer Basis, ob bei Stiller'schem Habitus oder infolge sekundärer Geweberschwächung, immer bleibt der Entstehungsmechanismus derselbe: auf irgendeine Weise wird die Uterusvorderwand dem Abdominaldruck zugänglich gemacht und durch seine Wirkung der Uterus nach hinten gebebelt. Als Voraussetzung hierfür sehen wir eine Störung des normalen Tonus-Turgorspieles an, insbesondere einen Tonusverlust der Uteruswand selbst.

Damit sind aber noch nicht alle Entstehungsmöglichkeiten einer R.V.F. erschöpft. Der Uterus kann auch einfach nach hinten gedrängt werden durch einen Tumor; hier kommen in Frage: ein Blasentumor, Cervixtumoren und vorgefallene Ovarialtumoren. Die gleiche mechanische Wirkung üben aber auch anteuterin gelegene Flüssigkeitsansammlungen aus, wie Exsudate, Hämatome und ähn-

liches. Diese Fälle müssen natürlich alle als eine R.F. fixata angesprochen werden. Eine solche kann auch entstehen durch Zug pelveoperitonitischer Adhäsionen oder durch Schrumpfung retrouterin gelegener Exsudate und Adnextumoren. Bedeutungsvoll für die Gutachtertätigkeit ist schließlich noch die Frage der traumatischen Genese der R.F.V. Sie ist heiß umstritten; doch gelang es F r i t s c h in zwei und C r a m e r in vier Fällen, einwandfrei eine traumatische R.V.F. nachzuweisen, weil zufällig kurz vor der Einwirkung des Traumas ein Unterfuchung aus anderen Gründen stattgefunden hatte.

Wenn man auch in der Zeit, als man die pathologischen Lage- und Formveränderungen des Uterus zu erforschen begann, diesen und speziell der R.V.F. zu viel und zu verallgemeinert Wert beigelegt hat, wenn man eine Zeitlang fast alle physischen und psychischen Störungen im Leben der Frau einer zufällig bestehenden R.V.F. zur Last gelegt hat, so war das ohne Frage zu weit gegangen. Man muß sich aber andererseits davor hüten, in den gegenteiligen Fehler zu verfallen, d. h., der Lageveränderung als solcher sämtliche Symptome abzusprechen, wie das gerade in der neueren Literatur wieder geschieht.

Man unterscheidet auch heute noch bei der R.V.F. lokale und allgemeine Beschwerden. Bei den lokalen Störungen nimmt bei weitem den größten Raum ein eine Störung der zyklischen Blutungen im Sinne einer Hypermenorrhoe. Schon F r i t s c h beschreibt sie 1885 als ein für die R.F. charakteristisches Symptom; V e i t zusammen mit K ü s t n e r spricht von der Menorrhagie als einem konstanten und früh auftretendem Symptom (1907). Auch S t ö c k e l stellt in seinem neuesten Buche die Menorrhagien an die erste Stelle. Sie können hervorgerufen sein durch venöse Stauung infolge Torsion der Parametrien oder durch primäre oder sekundäre Hypotonie der Uterusmuskulatur, die eine genügende Gefäßkompression nicht zuläßt. Demgegenüber äußert sich v. J a f c h k e in dem 1929 von S t ö c k e l herausgegebenen Handbuch völlig gegenteilig. Nach seiner Meinung ist die Hypermenorrhoe nie durch Stauung bedingt, da sie auch bei anteflektiertem Uterus ebenso häufig auftreten soll. Außerdem helfe eine Lagekorrektur nur in etwa einem Drittel aller Fälle, wie H ö l d e r und S e l l h e i m an Hand ihrer Statistiken klargelegt hätten. Wir haben früher bei unseren Kranken der Operation ein Curettement vorausgehen lassen, um die Hypermenorrhoe zu beheben. Das hat sich aber später als überflüssig herausgestellt, da schon die Lagekorrektur allein eine völlige Besserung brachte (vgl. Krkg. Nr. 6). V. J a f c h k e führt die Hypermenorrhoe auf Schlaffheit der Uterusmuskulatur

zurück; diese Schlaffheit ist aber seiner Meinung nach keine Folge der bestehenden R.V.F., sondern eine ihr coordinierte Folgeerscheinung der allgemeinen Asthenie. v. J a f c h k e lehnt jeden Causalnexus zwischen Menstruationstypus und Menstruationsbeschwerden einerseits und Retrodeviation des Uterus andererseits vollkommen ab, d. h. in der letzten Konsequenz, er müßte eine therapeutische Beeinflussung der Menstruationsstörungen durch Reposition der Gebärmutter ablehnen. Eine Frage erscheint uns in diesem Zusammenhang wichtig, die v. J a f c h k e zwar angeschnitten aber nicht beantwortet hat: kann sich der anteflektierte Uterus besser kontrahieren als der retroflektierte? Die Antwort geht schon hervor aus der klinisch allgemein bekannten Tatsache, daß im Puerperium der Uterus oft in atypischer Weise blutet, sei es kontinuierlich, sei es in kurzen Abständen, und daß diese Blutungen prompt zum Stillstand gebracht werden können durch Lagekorrektur (P e f f a r). Es handelt sich in dem Falle also offensichtlich nur um eine relative Insuffizienz der Uterusmuskulatur.

Was die von v. J a f c h k e abgestrittenen Stauungsercheinungen anbetrifft, so sei darauf verwiesen, daß wir bei einer großen Anzahl von Laparotomien ein ganz deutliches Anschwellen des vergrößerten Uterus nach seiner Aufrichtung noch während der Operation beobachten konnten. Ebenso lassen die vielen Fälle, in denen die Lagekorrektur eine totale Behebung der Menorrhagien brachte, u. E. nicht auf die von v. J a f c h k e betonte völlige Zusammenhanglosigkeit zwischen Menorrhagien und R.V.F. schließen.

Ebenso heftig streitet auch v. J a f c h k e in dem von S t ö c k e l herausgegebenen Buche die Entstehung von Fluor auf Grund einer R.V.F. ab. S t ö c k e l bejaht hingegen in seinem zwei Jahre später erschienenen Buche wieder einen Zusammenhang, indem er den Fluor auf Stauungshyperämie zurückführt. v. J a f c h k e bestreitet auch, daß Endometritis eine Folge von R.V.F. sein könnte. Auf Grund unserer therapeutischen Erfolge müssen wir jedoch einen Kausalzusammenhang annehmen. Da v. J a f c h k e aber den Fluor bei R.V.F. nicht ganz ablehnen kann, schreibt er dessen Entstehung einer Stauung auf asthenischer Grundlage zu. Tatsache dagegen ist, daß man gerade bei R.V.F. eine Wandverstärkung der „asthenischen“ Gefäße anatomisch nachgewiesen hat. Die asthenischen Gefäße sind reichlich unbewiesen; bewiesen dagegen ist, daß der Uterus nach der Lagekorrektur abschwilt, und Menorrhagien und Fluor prompt aufhören. Eine Verwechselung von Uterusfluor und Vaginalfluor ist außer Virgines u. E. bei forgfältiger Speculumuntersuchung nicht möglich. Weiter macht v. J a f c h k e eine konstitutionelle Ovarialinsuffizienz für das Zustandekommen von Fluor

in manchen Fällen verantwortlich. Eine Ovarialinsuffizienz, primärer Art oder sekundär durch Stauung der Ovarialgefäße bedingt, trägt aber weniger zu Fluor bei als vielmehr zur Entstehung von Polymenorrhoe (Stöckel) und, bei höherem Grade der Insuffizienz, auch zur Oligomenorrhoe (Siebkke); diese Symptome der Ovarialinsuffizienz kommen auch physiologisch oft in der Zeit der Entwicklung resp. der Rückbildung des Genitales sowie compenstatorisch bei schweren Krankheiten vor.

Die bei R.V.F. vorkommenden Störungen der Miktion sind durch die veränderte Stellung der Portio bedingt; sie drückt auf das Trigonum vesicae und verursacht dadurch Schmerzen; sie zieht am Sphincter vesicae und führt dadurch zu Incontinenz. Nach v. Jafschke soll ein gewisser Blasenreiz zustande kommen durch die Peristaltik des in der Excavatio vesico-uterina arbeitenden Darmes. Im Übrigen will derselbe Autor Beschwerden von seiten der Blase nur bei neurolabilen Individuen gesehen haben oder bei R.F.V. uteri gravidarum incarcerata. Gerade bei der letzten Komplikation kommt es jedoch nicht nur zu Miktionsbeschwerden sondern in extremen Fällen sogar zur Cystitis dissecans gangraenosus (Stöckel); überhaupt ist die Incarceration des graviden Uterus das einzige Moment, das die R.V.F. zu einer unmittelbar lebensbedrohenden Krankheit macht.

Obstipationsbeschwerden werden nach v. Jafschke durch R.V.F. nicht hervorgerufen. Sie kommen in Wirklichkeit aber bei der R.V.F. vor und sind (nach Stöckel) auf Muskelschlaffheit zurückzuführen als Folge von Asthenie und Enteroptose. Wir machen auch die chronische Obstipation verantwortlich für die häufig eine R.V.F. begleitende Appendicitis chronica, die wir in 13% unserer Fälle fanden.

Daß durch eine R.V.F. oft Sterilität bedingt ist, wird schon durch die Tatsache bewiesen, daß nach erfolgter Lagekorrektur manchmal prompt Conception erfolgt (vgl. Krkg. Nr. 7 und 8). denn erschwerend für die Conception wirkt fraglos der Umstand, daß die Portio aus dem Receptaculum feminis vaginae herausgehoben ist. Das kann auch v. Jafschke nicht ganz von der Hand weisen. Oft wird auch primäre, schon zur R.V.F. disponierende Hypoplasia genitalis für die Unfruchtbarkeit verantwortlich gemacht. Da es durch die venöse Hyperaemie auch zu Endo- und Myometrialveränderungen kommen kann, (Stöckel), ist auch an erschwerte Nidationsbedingungen des befruchteten Eies in der Uterus Schleimhaut zu denken.

Diese Schleimhautveränderungen des Uterus sind auch wohl

die Ursache für die bei R.V.F. außerordentlich häufig vorkommenden Aborte. Bei Fehlgeburten in späteren Monaten (Mens III—IV) ist jedoch eine Einwirkung durch mechanische Reizung der Uteruswand infolge Einklemmung wahrscheinlicher. Der Abort ist im Übrigen das einzige R.V.F.-Symptom, das v. J a f c h k e noch gelten läßt. Der habituelle Abort ist aber praktisch einer Sterilität gleichzusetzen. Nicht ohne Einfluß auf die Conceptionsmöglichkeit sind fraglos die bei R.V.F. vorkommenden Cohabitationsbeschwerden, die ihre Ursache entweder in einer hypoplastisch-engen Vagina haben, oder die entstehen durch Druck auf die bei R.V.F. fast immer descendierten Ovarien.

Die körperlichen Symptome einer R.V.F. variieren außerordentlich stark; die Beschwerden zeigen alle Übergänge von den schleichend einsetzenden bis zu akuten, anfallsähnlichen Formen. Einen Fall beobachteten wir, wo die Patientin mit der Diagnose Appendicitis eingeliefert wurde. Es stellte sich aber gelegentlich der gynäkologischen Operation heraus, daß die Appendix keinerlei entzündliche Veränderungen aufwies, wie der pathologisch-histologische Befund uns auch später bestätigte. Der zweite Fall wurde gleichfalls unter stürmischen, akuten Appendicitisercheinungen eingeliefert, und der Operationsbefund zeigte einen retroflektierten, torquierten Uterus bei völlig reaktionsloser Appendix (vgl. Krkg. Nr. 9).

Der psychische Einfluß der R.V.F. spielt eine bedeutende Rolle, die allerdings in den meisten Fällen nicht genügend gewürdigt wird. Auch werden die Störungen von Seiten der Psyche bei der Erhebung der Anamnese leicht übersehen, weil die Patientinnen sich ihrer entweder nicht bewußt sind, oder sich schon so an sie gewöhnt haben, daß sie dieselben gar nicht besonders hervorheben. Die psychischen Störungen machen sich in zwei Richtungen geltend: einmal in der Gesamtpersönlichkeit und ihrem Gebaren zur Umwelt; die Frauen sind außerordentlich reizbar, haben Neigung zu Depressionen, Unlustgefühle kommen auf, eine deutliche Verschlechterung der Entschlußkraft tritt ein; zum anderen ändert sich bei diesen Frauen die Einstellung zum anderen Geschlecht: Die R.V.F. hebt die Libido auf infolge psychischer Hemmungen; eine hormonale Störung braucht hierbei keinesfalls vorzuliegen, was in bezug auf die Therapie von Wichtigkeit ist. Zerwürfnis und Zerrüttung auch der besten Ehe kann natürlich hierdurch eintreten, wenn hier nicht rechtzeitig Abhilfe geschaffen wird.

Diese psychischen Veränderungen zusammen mit den oben genannten körperlichen Beschwerden können — um mit F r i s c h zu sprechen — sehr wohl aus einer blühenden, kräftigen Frau eine Ruine machen, eine unbrauchbare, unliebenswürdige, stets kränk-

liche, unzufriedene, vollkommen invalide Hysterica, ein Satz, den v. J a f c h k e als „recht absonderlich anmutend“ bezeichnet!

Zu diesen charakteristischen Symptomen kommen häufig noch andere Beschwerden allgemeiner Art, wie Herzklopfen, Müdigkeit und Magenbeschwerden; ein direkter Zusammenhang zwischen den Magenbeschwerden und einer gleichzeitig bestehenden Appendicitis chronica ist in vielen Fällen erwiesen (B u n g e). Die Allgemeinbeschwerden im übrigen lediglich der primären, Stiller'schen Afthenie zuzuschreiben, geht viel zu weit. Wir haben gerade in diesen sozial wichtigen Fällen durch unsere Therapie manche arbeitsunfähige Frau wieder vollkommen leistungsfähig gemacht!

Man kann sagen, daß wir durch unsere Lagekorrekturen so eindeutige und zufriedenstellende Erfolge erzielt haben, — mögen sie auch z. T. vielleicht nur psychisch bedingt sein —, daß diese in kräftigem Gegensatz stehen zu der von v. J a f c h k e vertretenen Auffassung: irgendwelche charakteristischen Symptome der R.V.F. gibt es überhaupt nicht, ein schwerwiegendes Urteil, auf Grund dessen v. J a f c h k e u. E. logischerweise jede Therapie der R.V.F. als solcher ablehnen müßte.

Die Ansicht über die Notwendigkeit, bei den Lage- und Formveränderungen des Uterus eine Therapie einzuleiten, hat sich im Laufe der Zeit häufig geändert. Auch die Wahl der Methode hat außerordentlich variiert. Im Anfang des 19. Jahrhunderts versuchte man, alles durch die Pessarbehandlung zu beheben; selbst fixierte Retroflexionen wurden durch kombinierte Massage-Pessarbehandlung angegangen. Im Anfang des 20. Jahrhunderts wiederum gewannen operative Lagekorrekturen die Oberhand; jede, wenn auch nur gelegentlich entdeckte, symptomlose Retrodeviation wurde als schwerwiegendes Krankheitsbild gewertet und entsprechend behandelt.

Heute steht man im allgemeinen prinzipiell auf dem Standpunkt, wie ihn schon S c h r o e d e r 1896 formulierte: „In den Fällen, in denen der normale Uterus nach hinten liegt und gar keine Beschwerden macht, tut man am besten, ihn hier liegen zu lassen.“ Wir leiten heute die R.V.F.-Therapie nur dann ein, wenn wir mit einiger Sicherheit vermuten können, daß die geklagten Beschwerden tatsächlich mit der Lage- resp. Formveränderung des Uterus in ursächlichem Zusammenhang stehen.

Für die Lage- und Formkorrektur gelangen heute zwei verschiedene Methoden zur Anwendung: die unblutige Pessarbehandlung und die blutige durch Operation. In der Zeit vor Einführung der Asepsis blieb man in der Hauptsache auf die Pessarbehandlung

angewiesen; das hat Erfolg natürlich nur bei der vollkommen mobilen R.V.F., denn Voraussetzung für eine erfolgreiche Pessarbehandlung ist die Aufrichtbarkeit des Uterus; das Pessar soll ja den Uterus nicht aufrichten, sondern nur den vorher aufgerichteten Uterus in seiner neuen Lage stützen.

Die ersten operativen Lagekorrekturen fallen in die Jahre 1867—1868, bei denen man die Portio vaginalis uteri durch Verätzung oder Nahtanfrischung an der hinteren Scheidenwand fixierte. Im Jahre 1881 führte Alexander zum ersten Male die nach ihm benannte Verkürzung der runden Mutterbänder durch, wie sie schon 1840 von Alquier und Aran vorgeschlagen wurde. 1882 berichtete Adams schon über die ersten Erfolge dieser Methode.

Wie v. Jäschke schreibt, soll Ohlshausen der erste gewesen sein, der eine Lagekorrektur per laparatomiam im Jahre 1886 vorschlug. Demgegenüber schreibt Schroeder in seinem 1886 erschienenen Buche schon: „Am radikalsten ist Koeberle verfahren, der bei einer R.F. die Laparotomie machte, den Uterus nach vorn brachte und in den unteren Wundwinkel wie bei einer Ovariotomie einheilte.“ Damit ist wohl bewiesen, daß Koeberle mit dieser im Jahre 1869 ausgeführten Operation der erste war, der eine R.F. durch Laparotomie zu heilen versuchte. Im Jahre 1892 wurde die erste vaginale Antefixation gemacht. Seit dieser Zeit hat sich dann eine Reihe von Methoden entwickelt, so daß ihre Zahl im Jahre 1910 ungefähr 217 betrug, während man in neuester Zeit die erkleckliche Menge von ca. 300 Methoden zählt (v. Jäschke). Da doch die meisten der Methoden veröffentlicht wurden, nahm die Behandlung der R.V.F. in der Literatur der Vorkriegszeit vielleicht einen breiteren Raum ein, als ihr ihrer Bedeutung nach zustand. Unerfreulicherweise arteten aber viele dieser Veröffentlichungen aus in kleingeistigen, ehrgeizigen Prioritätsstreit um kleine und kleinste Modifikationen der prinzipiellen Operationsverfahren.

Diejenigen Operationen, die sich haben durchsetzen können, seien der Vollständigkeit halber kurz hier zusammengefaßt:

Drei verschiedene Wege stehen uns zur Verfügung, der inguinale, der vaginale und der abdominale. Die Fixation des Uterus bzw. seines Bandapparates erfolgt auf mannigfache Art.

1. Die Fixation des Uterus an der vorderen Bauchwand.

- a) Kocher geht radikal vor, indem er den Uterus extraperitoneal verlegt und ihn zwischen Bauchdecken und Haut vernäht.
- b) Leopold und Czerny belassen den Uterus intraperitoneal und befestigen ihn mit Nähten, die sie durch

Peritoneum und Fascie oder auch durch die ganze Bauchwand ziehen.

2. Die Fixation an der Blase.

Es ist dies eine Methode, die entstanden ist aus einer Verschließung des Cavum vesico-uterinum gelegentlich einer anderen abdominalen Antefixationsmethode lediglich zu dem Zweck, einen Ileus zu vermeiden. Sie ist aber — allerdings unbeabsichtigt — diejenige Methode, die der für die Mechanik der Uteruslage wichtigen Notwendigkeit einer darmfreien, capillären Excavatio vesico-uterina entspricht. Sie wurde zuerst von *Werth* angegeben. Eine vaginale Vesicofixation wurde von *Halban* beschrieben.

3. Die Fixation an der Vagina.

Sie bringt derartig viele Nachteile, daß sie kaum noch angewandt wird, wie überhaupt die vaginalen Methoden heute schon fast historisch genannt werden können (*Stöckel*). Das Bedürfnis nach vaginalen Methoden ließ sich erklären aus dem Wunsche, möglichst nicht das Peritoneum zu eröffnen. Heute kann von einer geringeren Gefahr einer vaginalen Operation nicht mehr die Rede sein, ja, man hält sie sogar für gefährlicher als eine Laparotomie, da auch bei größter Sorgfalt eine exakte Asepsis nicht möglich ist. Außerdemengt sich das Anwendungsgebiet des vaginalen Weges selbst ein, da er selbstverständlich bei *Virgines* nicht begangen werden kann und auch bei *Nullipara* wegen der technischen Schwierigkeiten meist gemieden wird.

4. Fixation der Ligamenta rotunda.

In der Leistengegend mit oder ohne Verkürzung der Bänder nach *Alexander-Adams*.

Ohlshausen fixierte die Lig. rott. durch einige Nähte an der vorderen Bauchwand.

Gilliam und *Dolérís* zogen eine Schlinge des Lig. rot. durch Peritoneum, Muskulatur und Fascie und nähten beiderseits die Schlingen auf der Fascie fest.

5. Die intraperitoneale Verkürzung der Ligamenta rotunda.

Sie wurde zuerst ausgeführt von *Bode* und *Polk*, indem diese eine Schlinge in das Lig. rot. legten. *Menge* änderte dieses Verfahren dahin ab, daß er das mitgefaltene Lig. latum auf der Vorderseite des Uterus annähte. Darüberhinaus empfahl *Pankow* später eine *Duplicatio* und *Lange* gar die *Triplificatio*.

Die meist nach *Webster* und *Baldy* benannte Methode

ist die, das Lig. latum zu durchbohren, das Lig. rot. hindurchzuziehen und auf der Rückseite des Uterus zu vernähen.

Welche dieser zahlreichen Methoden oder welche ihrer noch zahlreicheren Modifikationen man wählen wird, hängt von den orthopädischen und funktionellen Dauerresultaten ab, die zuverlässig nur an größeren Serien beurteilt werden können. Ein hundertprozentig sicheres orthopädisches Ergebnis wird fraglos erzielt durch die sog. fixierenden Methoden, d. h. solche, bei denen der Uterus in bindegewebige Verbindung mit seinen Nachbarorganen gebracht wird. Solche Methoden sind die K o c h e r'sche und die Vaginaefixation nach D ü h r s e n und M a c k e n r o t h. Die fixierenden Methoden verursachen aber schwerste Störungen von Schwangerschaft und Geburt. Sie dürften daher nur angewandt werden bei gleichzeitiger Sterilisation oder bei Frauen jenseits des gebärfähigen Alters. Man sollte aber auch in diesen Fällen zu suspendierenden Methoden greifen, deren Ergebnisse zwar um einige Prozent weniger gut sind, die aber dem Uterus weitgehend seine physiologische Beweglichkeit lassen und dadurch keine Einschränkung der Funktionen des Uterus oder seiner Nachbarorgane hervorrufen.

Die L e o p o l d - C z e r n y'sche Operation ist — streng genommen — wegen der sero-serösen Anheftung eine suspendierende Methode. Trotzdem kommen Geburtsstörungen häufig vor, die vielleicht auf falsche Nahttechnik zurückzuführen sind (H a l b a n). Aber allen Ventrofixationen wie auch den Verfahren von O h l s h a u s e n und D o l é r i s haftet die große Gefahr des Ileus an. Darmeinklemmungen zwischen Uterus und Bauchwand finden sehr leicht statt. Bei der Methode von L e o p o l d - C z e r n y wurde beobachtet, daß die Fixationsstelle von Uterus und Bauchwand sich dehnt, zu einem langen Band auswächst und so nicht nur zum Recidiv sondern vor allem leicht zum Ileus führen kann.

Aus den oben angeführten Gründen bedienen sich auch die meisten Gynäkologen der Ligg. rott., um den Uterus in dauernde Anteflexionsstellung zu bringen. Bei der Bänderverkürzung kommt für die meisten Fälle auch nur die intraperitoneale in Frage, da sich der A l e x a n d e r - A d a m s von selbst ausschließt bei der fixierten R.V.F. und auch in den übrigen Fällen der mobilen R.V.F. noch viel Recidive aufweist. Wir wenden ebenso wie H a l b a n und andere Autoren die inguinale Methode in geeigneten Fällen nur bei gleichzeitig bestehender Leistenhernie an.

Die Laparotomie ist auch deswegen empfehlenswert, weil man

gleichzeitig die Adnexe freilegt und etwa vorhandene pathologische Veränderungen angehen kann, sei es, daß sie unabhängig vom Grundleiden vorkommen, sei es, daß sie der R.V.F. koordinierte oder subkoordinierte Krankheiten sind. Aus diesem Grunde mehrten sich auch die Anhänger der Laparotomie. In neuester Zeit empfahl noch Kahr, in jedem Falle die Laparotomie auszuführen; er rät besonders von der Anwendung des Alexander-Adams ab. Bei jeder Lagekorrektur führen wir außerdem gleich die Appendektomie mit aus. Bei den intraabdominellen Methoden nach Bode, Polk und Menge ist eine venöse Stauung zu befürchten in den Lig. lata, die — mehrfach gefalten — auf dem Uteruskörper vernäht werden.

Aus allen diesen Erwägungen heraus blieb für uns die Methode der Wahl diejenige nach Webster-Baldy (W.B.), über die schon einige Statistiken mit ausgezeichneten Dauerresultaten vorliegen. Auch in der Stöckel'schen Klinik wird dieses Verfahren bevorzugt. Aus einer von Stöckel 1924 veröffentlichten Tabelle ersieht man, daß er 1918 in Leipzig die erste Operation nach W.B. ausgeführt hat; im Jahre 1919 operierte er 13, im folgenden Jahre 14 Fälle nach dieser Methode und 1931 schreibt er, daß er dieses Verfahren bevorzuge, eine Tatsache, die für die Güte dieser Operationsmethode spricht. In der vorerwähnten Stöckel'schen Tabelle findet man folgenden, bezüglich des orthopädischen Erfolges interessanten Vergleich: von 363 nach Alexander-Adams operierten Patientinnen wurden 194 nachuntersucht, also wenig mehr als die Hälfte. Davon hatten 9,5% ein Recidiv. Demgegenüber stehen 30 Fälle nach der Webster-Baldy'schen Methode, von denen jedoch 26 nachuntersucht wurden, also fast 90%! Bei diesen 26 Nachuntersuchten wurde nicht nur kein Recidiv festgestellt, sondern im Gegenteil zeigten sie noch alle ein ausgezeichnetes Resultat, während von den nach Alexander-Adams Operierten recht viele Ergebnisse nur als „zufriedenstellend“ bezeichnet werden konnten.

Dieses im Verhältnis zu anderen Kliniken schlechte Resultat der Alexander'schen Operation führt Stöckel z. T. auf den Umstand zurück, daß er seine Assistenten viel selbständig operieren läßt, z. T. aber — und das erscheint uns wichtig — läßt er die Möglichkeit offen, daß eine etwa vorhandene Fixierung bei der Untersuchung nicht bemerkt wurde (vgl. Krkg. 5 und 10), oder daß die Ligg. rott. eventuell zu schwach waren, um den Uterus in Anteflexioversio zu erhalten. Um diese Gefahren sicher auszuschalten, machen wir von vornherein die Laparotomie. Über Recidive post partum belehrt uns eine andere Tabelle: von 86 nach Ale-

xander-Adams operierten Fällen bekamen 5 ein Recidiv, i. e. 5,9%; dagegen wurde bei 3 Frauen, die vorher nach W.B. operiert worden waren, kein Recidiv p.p. gesehen, also 0%!

Baldy selbst veröffentlichte im Jahre 1909 eine Statistik über 100—200 Fälle, die er nach der von ihm ausgearbeiteten Methode operiert hat. Danach hatte er nur im Anfang einige unbefriedigende Ergebnisse, die er darauf zurückführt, daß seine Operationstechnik noch nicht vollkommen war. Die später operierten Frauen blieben jedoch recidivfrei. Auch hat er bei 20—30 Frauen, die nach der Operation concipierten, den Verlauf der Schwangerschaft und der Geburt beobachtet und hebt deren völlig ungestörten Verlauf hervor, obwohl es bei einer ganzen Anzahl dieser Frauen zu erheblichen Störungen der Schwangerschaften gekommen war, die sie vor der Operation durchmachten.

Bevor ich auf die operative Therapie im Besonderen eingehe, möchte ich einige grundsätzliche Bemerkungen machen über die bei uns geübte Behandlung der R.V.F.

Über die Notwendigkeit der Behebung einer R.V.F. wird schon lebhaft gestritten, seitdem diese pathologische Veränderung dank der grundlegenden Untersuchungen durch B. S. Schultze bekannt ist. Heute stehen wohl die meisten Gynäkologen auf dem Standpunkt, den schon Fritsch und Schröder vertraten: eine nur zufällig entdeckte, nur unwesentliche Beschwerden machende Lage- bzw. Gestaltsveränderung unter allen Umständen unbehandelt zu lassen und vor allem die Patientinnen nichts von dem anormalen Genitalbefund wissen zu lassen.

So behandeln wir die R.V.F. auch prinzipiell nur dann, wenn wir mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen müssen, daß die geklagten Beschwerden in ursächlichem Zusammenhang mit der gefundenen pathologischen Veränderung stehen. Haben wir aber einmal diese Überzeugung, so ist unser Vorgehen auch in den meisten Fällen ein radikales, d. h., den weitaus größten Teil unserer behandlungsbedürftigen Lage- und Gestaltsanomalien beseitigen wir durch die Laparatomie. Die Pessartherapie ist bei uns immer mehr zugunsten der blutigen Methode verlassen worden.

Selbstverständlich halten wir streng an der konservativen Pessartherapie fest, wenn ganz allgemein eine Operation contraindiziert ist; ferner legen wir gern das Pessar ein, wenn sich in den ersten Monaten der Schwangerschaft eine R.V.F. zeigt. Das Pessar findet bei uns auch Anwendung bei Frauen, die nahe dem Klimakterium sind und wo deshalb zu erwarten ist, daß mit dem Erlöschen der Genitalfunktionen auch die Beschwerden von seiten des retro-

vertierten oder retroflektierten Uterus aufhören.

Bei der R.V.F. fixata wird wohl von allen Gynäkologen die Laparotomie ausgeführt. Wir betrachten sie aber als ebenso indiziert bei jugendlichen Frauen sowie bei Nullipara. Der große Vorteil der Laparotomie besteht vor allen Dingen darin, daß man das ganze innere Genitale sich einer eingehenden Inspektion zugänglich machen und dadurch sehr oft eine beginnende Degeneration des Uterus oder der Adnexe wahrnehmen und coupieren kann, die — unbehandelt geblieben — früher oder später doch vielleicht eine Laparotomie erforderlich gemacht hätte.

Wie schon oben erwähnt, haben wir uns aus der großen Zahl der intraabdominellen Lagekorrekturen für die Methode nach *Webster* und *Baldy* entschieden. Die genaue Technik der Operation sei hier kurz beschrieben:

Man lagert die Patientinnen in der *Trendelenburg'schen* Beckenhochlagerung. Die Bauchdecken werden durch den supra-lymphfären Fascienquerschnitt nach *Pfannenstiel* gespalten, worauf die Eröffnung des Peritoneums erfolgt. Das Anheben des craniellen Wundwinkels erleichtert das Herabsinken der Därme in die obere Bauchhöhle. Nun wird das Selbsthaltespeculum eingesetzt; dank dieses Speculums kann die ganze Operation bequem mit nur einem Assistenten ausgeführt werden. Es folgt genaueste Inspektion des Uterus und der Adnexe. Lösung eventuell vorhandener Adhäsionen und Behebung sonstiger pathologischer Befunde. Aufrichten des retroflektierten Uterus und Hervorziehen desselben mit zwei Klemmen, die man beiderseits an das Lig. ovarium proprium anklemt. Abstopfen der Bauchhöhle. An einer gefäßfreien Stelle wird nun das Lig. latum von der Hinterseite aus mit einer spitzen Mikulicz-Klemme durchstoßen und zwar unterhalb des Lig. ov. propr. Früher durchbohrten wir das Lig. latum von vorn her, haben aber die Erfahrung gemacht, daß die Auffindung der dünnsten Stelle im Lig. latum von der Rückseite her leichter ist. Beim Durchgang durch das Lig. latum halten wir uns möglichst tief unterhalb der Tube, um ein Mitzerren oder Abknicken derselben mit Sicherheit auszuschließen. Ist die Klemme mit ihrer Spitze auf der Vorderseite angelangt, wird sie geöffnet, das Lig. rot. wird gefaßt und durch den Schlitz des Lig. latum (vgl. Abb. 3) nach hinten gezogen; derselbe Vorzug wiederholt sich auf der anderen Seite. Retrouterin werden die beiden gefalteten Lig. rot. durch starke Seide miteinander vereinigt, und nun kann man mit der so gebildeten Schlinge in der Höhe variieren (wie dies in Abb. 4 durch die Pfeile angedeutet ist), bis man die Stelle des Corpus uteri gefunden hat, bei der der Uterus in der günstigsten Weise eleviert und ante-

flektiert wird. Hier wird die Schlinge mit starker Seide angeheftet, und zwar in der Mitte und noch jederseits nahe dem lateralen Uterusrande (vgl. Abb. 5). Durch die beiden lateralen Nähte wird der Schlitz zwischen Uterus und Lig. rot. geschlossen und somit die Gefahr eines Ileus an dieser Stelle weitgehendst ausgeschaltet. Wir sehen auch darauf, das Lig. rot. durch unsere Nähte nicht vollkommen zu umschnüren, um eine Zirkulationsstörung und eine Druckatrophie zu vermeiden. Nachdem die den Uterus hochhaltenden Klemmen gelöst worden sind, überzeugt man sich nochmals von der guten Lage und Form des Uterus sowie von der völligen Blut-trockenheit des Operationsgebietes. Im Anschluß an die Antefixation wird dann prinzipiell noch die Appendektomie ausgeführt. Dann wird das Peritoneum sorgfältig vernäht, und die Bauchdecken werden in Schichten geschlossen.

Bei der Suche nach dem Ursprung der oben geschilderten Operationsmethode stieß ich in der deutschen Literatur auf so viele Schwierigkeiten und Ungenauigkeiten, daß ich versucht habe, aus den mir zur Verfügung stehenden spärlichen amerikanischen Originalarbeiten ein genaues Bild zu gewinnen über die Entstehung und die Prioritätsfrage und damit der Benennung der vorstehenden Operation (vgl. auch meine Arbeit: Über die Webster-Baldy-Franke'sche Operation, im Zbl. Gynäk. 1935, Nr. 50, Seite 2951 ff.).

Die Unsicherheit, die die Entstehung und Namengebung dieser Operation umgibt, wird offenkundig, wenn man die einschlägige Literatur auf diese Punkte hin untersucht. Halban spricht in seiner gynäkologischen Operationslehre von der Baldy'schen Operation, Stöckel nennt sie 1929 die Webster-Baldy'sche Methode, während er 1930 für daselbe Verfahren wieder den Namen Baldy'sche Operation gebraucht. In anderen Veröffentlichungen wird wieder von der Methode nach Baldy und Franke gesprochen, ja, man ist sogar nicht davor zurückgeschreckt, die Operation mit vier Namen zu belegen, wie Webster-Baldy-Franke-Alfieri und ähnliches. Unverständlich erscheint, daß diese Operationsmethode auch in neueren Spezialwerken der operativen Gynäkologie nicht einmal erwähnt wird, obwohl die Operation sich seit ihrem Bekanntwerden auch in Deutschland ständig wachsender Beliebtheit erfreute, auch an größeren Kliniken wie der von Stöckel, Heynemann und anderen (z. B. Franz: Gynäkologische Operationen, erschienen 1925). In den einschlägigen Hand- und Lehrbüchern bestanden aber nicht nur bei den verschiedenen Büchern ansehnliche Differenzen in bezug auf die Benennung und genaue Technik der Operation, sondern es zeigte sich sogar, daß in ein und demselben Buche manchmal die Abbildung eine andere Methode darstellt, als



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3




Abb. 4



Abb. 5

der dazugehörige Text sie beschreibt.

Diese unklaren Verhältnisse drängten mich zu der Frage: Wie steht es nun mit der genauen geschichtlichen Entwicklung dieser Operation?

In der deutschen Literatur wird die Operation zum ersten Mal erwähnt in der Monatschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie des Jahres 1902 in einem Referat über amerikanische geburtshilfliche und gynäkologische Literatur. Es heißt dort: „J. C. Webster zieht die runden Ligamente gefaltet hinter den Uterus zurück und befestigt sie an dessen hinteren Wand.“ Eine nähere Quellenangabe war leider in diesem Referat nicht vorhanden. Wie sich aber später zeigte, war diese Stelle des Referates in Europa vollkommen unbeachtet geblieben. Die Arbeit Websters, auf die sich dieses Referat bezog, fand ich dann im J. amer. med. Assoc., vom 5. Oktober 1901: A satisfactory operation for certain cases of retroversion of the uterus. Er schreibt hier: „During the past year I have carried out the following procedure“, ein Satz, dem im Hinblick auf den später entstandenen Prioritätsstreit erhöhte Bedeutung zukommt. Dann wird von Webster der Verlauf der Antefixation geschildert: „The fundus of the uterus is elevated and pushed forward. A small hole is then made through the broad ligament on one side under the utero-ovarian ligament near the uterus. Through it a pair of forceps is passed from behind in order to grasp the round ligament about an inch from its uterine end. The latter is then pulled through the broad ligament in a double fold. It is carried across the back of the uterus a short distance above the utero-sacral ligaments and is then stitched in this position with chromic catgut. A similar procedure is carried out on the other side, the second round ligament being stitched to the back of the uterus above or below the first one or crossing it. The amount of overlapping of the round ligaments depends upon their length and laxity. Each ligament is also stitched to the edge of the hole in the broad ligament.“ Damit hat Webster im Prinzip die Operationsmethode veröffentlicht, wie sie heute auch in den meisten Lehrbüchern angegeben wird: Hochziehen des Uterus, Durchstoßen der Lig. lata, Hindurchziehen der Lig. rot. und Annähen derselben auf der Hinterseite des Uterus. Wesentlich in dem Artikel Websters ist, daß er uns beschreibt, wie er zuerst das eine Lig. rot. retrouterin fixiert, und wie dann erst das zweite runde Mutterband durchgezogen und über oder unter dem ersten befestigt wird. Diese Art des Vorgehens geht auch eindeutig aus einer beigefügten Skizze hervor (vgl. Abb. 1). Schon in dieser Arbeit erwähnt Webster, daß durch diese Operation die Ovarien beträchtlich eleviert

würden; ebenso betont er schon die gänzliche Ungefährlichkeit dieser Methode für die Schwangerschaft und die Geburt, da die physiologische Beweglichkeit des Uterus weitgehend erhalten sei. Auch die Gefahr der postoperativen Adhäsionen ist seiner Meinung nach eine geringe, da man nirgends eine rauhe, blutende Stelle hinterläßt.

Welchen Anteil hat nun Baldy, der auch oft im Kampfe um die Priorität des Prinzips genannt wird, an der Entwicklung der vorliegenden Operation?

In der Mainnummer des Amer. J. Obstetr. vom Jahre 1902 veröffentlichte er eine Arbeit: A new operation for retrodisplacement of the uterus, nach einer Vorlesung, die er am 20. 2. desselben Jahres in Philadelphia gehalten hatte. Aus der Einleitung zu dieser Arbeit geht hervor, daß er die Arbeit J. C. Webster's gekannt hat. Er ändert aber das Verfahren Webster's grundsätzlich ab, indem er die Lig. rot. nahe ihrem Uterusanfatz durchschneidet und die peripheren Stümpfe, die er durch die Ligg. lata hindurchzieht, auf der Hinterwand des Uterus ziemlich lateral anheftet (vgl. Abb. 2). Auch diese Arbeit erschien in Form eines Referates in der deutschen Literatur; doch dieses Referat scheint das Schicksal des Berichtes über die Webster'sche Arbeit geteilt zu haben, indem es völlig unbeachtet blieb. In dieser Veröffentlichung Baldy's kann von einer retrouterinen Schlingenbildung mit Hilfe der zusammengehefteten Ligg. rott. nicht die Rede sein.

Dann veröffentlichte Baldy aber im Jahre 1903 im N.Y. State J. Med. eine Arbeit, die sich dadurch wesentlich von der ersten unterschied, daß er diesmal die Ligg. rott. nicht durchschnitt. Hier folgt er im Wesentlichen der Webster'schen Methode so weit, bis er die Ligg. rott. beiderseits auf die Hinterfläche des Ligg. latum gebracht hat; dann aber trennen sich die beiden Methoden:

„The both round ligaments being drawn to the posterior portion of the broad ligaments, the operator approaches them each other. The Ligg. rott. being united each other, they are united at two points to the uterus itself and the operation is completed.“ Damit hat Baldy ohne Frage als erster die sogenannte retrouterine Schlingenbildung beschrieben. Keiner, auch Webster nicht, hat vor Baldy diese Schlingenbildung ausgeführt, obwohl man das aus Baldy's eigenen Worten schließen könnte, wenn er in seiner ersten Veröffentlichung vom Jahre 1902 folgendes über die Webster'sche Operation schreibt:

„The one (of these procedures, d. Verf.) which has appealed most to me, however, and which seems to fill the most indications,

is the one, which perforates the broad ligament from its posterior aspect and drags the round ligaments through the opening thus made and unites them behind and to the uterus.“ Oder an einer anderen Stelle schreibt er über die Webster'sche Operation: „It (the operation, d. Verf.) forms a perfect sling behind the uterus, which may be or may not be attached to the uterus, as the operator chooses.“

Tatsächlich ist aber niemals bekannt geworden, daß Webster diese Schlingenbildung auch gemacht hätte. Im anderen Falle hätte Baldy auch nicht von einer neuen Art der Retroflexionsoperation sprechen dürfen. Daher sind auch die oben zitierten Sätze Baldy's wohl nur auf eine etwas ungeschickte Ausdrucksform des Autors zurückzuführen.

Dagegen schrieb Webster in einem Briefe an Baldy, daß er von Zeit zu Zeit auch die Ligg. rott. durchschneide u. zwar dann, wenn durch die Verdoppelung der Bänder und ihre Aneinanderheftung die Spannung so groß werden würde, daß er — besonders im Falle einer Schwangerschaft — einen Nahriß oder aber einen Abort befürchten müsse.

Das Prinzip, den Uterus in eine Schlinge zu fassen, war auch wohl wegweisend für Schubert bei der Entwicklung seiner Methode, bei der der Uterus mit Hilfe eines Pericardstreifens vom Rinderherzen in Antelexioversio gehalten wird. Auch dürfte das Baldy'sche Prinzip für die Polano'sche Fascientransplantationsmethode maßgebend gewesen sein.

Im Jahre 1909 veröffentlichte Baldy in der Zeitschrift: Surgery, gynecology and obstetrics, eine neuerliche Abhandlung über die Behandlung der R.V.F., deren statistischen Teil ich bereits weiter oben vorweggenommen habe. Der allgemeine Teil dieser Arbeit ist deswegen erwähnenswert, weil er zeigt, daß man auch schon zu dieser Zeit die R.V.F. nicht als ein für sich bestehendes Krankheitsbild vollkommen isoliert betrachtete, wies dies heute von manchen Gynäkologen der damaligen Generation vorgeworfen wird, sondern, daß man in den meisten Fällen die R.V.F. als Symptom einer anderen, übergeordneten Krankheit ansah. Davon zeugen folgende Sätze Baldy's:

„The time will come, when men will be just as much ashamed to speak and write of them (retrodisplacements, d. Verf.) as a distinct disease, as they are at present so to speak and write of ascites.“ Und weiter: „... the rule is: Retrodeviations of the uterus are mostly coincident with other lesions, and where such is the case, the symptoms almost universally, come from the associated disease.“

Nach solchen allgemeinen Bemerkungen folgen einige Sätze, die für die Frage der Priorität von Interesse sind, wenn Baldy fortfährt:

„There is another procedure with which I have been experimenting for the past twelve years and which is, I think, fully established and amply justified by results and which has taken the place of all other procedures in my practice for this class of cases.

The operation is not new. I first referred to it in a paper in 1902 after a few years trial only. I performed it almost constantly ever since, modifying it here and there at time as apparent difficulties arose, and as it seemed, to overcome certain objections and certain faults in result.“

Hier sagt Baldy also, daß er schon vor der Jahrhundertwende an der Entwicklung seiner Methode arbeitete. Das mag ihm nicht abgestritten werden. Wir müssen aber berücksichtigen, daß er 1902 als das Ergebnis seiner Versuche die Methode mit Durchtrennung der Ligg. rott. angegeben hat, und erst später, 1903, im Verlaufe der erwähnten Modifikation auf die Durchschneidung der Bänder verzichtet hat, so daß nach wie vor Webster der Schöpfer der Methode bleibt, die intakten runden Mutterbänder retrouterin anzuheften.

Während man in Amerika schon lebhaft über die verschiedenen Arten der retrouterinen Antefixation diskutiert, erscheint 1906 in der Presse Medicale eine Arbeit von Dartigues und Caraven, in der diese Verfasser die von den Amerikanern beschriebene Operation als neu und als von ihnen ausgearbeitet bezeichnen.

Doch diese Originalarbeit scheint nicht über die französischen Fachkreise hinausgekommen zu sein, denn im Jahre 1905 überschreibt F. Franke im Zbl. Gynäk. eine Arbeit: Fixatio ligamenti rotundi retrouterina, in der er dieselbe Methode eingehend beschreibt und theoretisch begründet. Auch er bezeichnet sie als neues Verfahren zur operativen Behandlung der R.V.F. uteri. Er schreibt darin noch, daß er dieser Methode seit sechs Jahren treu geblieben sei.

Beiden, den französischen, wie dem deutschen Verfasser ist offenbar die Existenz der amerikanischen Arbeiten unbekannt gewesen, so daß ihnen wohl eine unabhängige und selbständige Entwicklung der Methode zuerkannt werden kann, das Recht der Priorität aber von ihnen an die Amerikaner abgetreten werden muß. Das bestätigt auch Franke in vollem Umfange (Zbl. Gynäk. 1910) nachdem er von Hirsch auf seinen Irrtum hingewiesen worden war.

Trotzdem schreibt Frank e merkwürdigerweise in einer im Zbl. Gynäk. 1924 erschienenen Arbeit als Fußnote folgende wörtlich wiedergegebene Anmerkung: „Da über die Geschichte der Operation bzw. über die Priorität ihrer Erfindung offenbar nicht völlige Klarheit herrscht, so erlaube ich mir, folgendes zu bemerken: Ich habe die erste retrouterine Anheftung der runden Mutterbänder am 3. 1. 1901 ausgeführt, J. Webster hat sie im J. amer. med. Assoc. Oktober 1901 beschrieben, Baldy im Jahr 1902 in a paper.“ Demnach hat Frank e die Operation zuerst im Januar 1901 ausgeführt; Webster schrieb aber im Oktober desselben Jahres: „Ich habe im Laufe des vergangenen Jahres folgendes Verfahren ausgeführt. . . „Daraus ist erwiesen, daß Webster die Operation vor Franke ausgeführt hat. Baldy hat noch 1902 die Ligg. rott. durchschnitten und ist erst im Jahre 1903 dazu gekommen, das Webster'sche Prinzip mit Erhaltung der runden Mutterbänder durchzuführen. Neu bei der Baldy'schen Methode war lediglich, daß er die retrouterin verlagerten runden Bänder zuerst miteinander vernähte und dann die so gebildete Schlinge an der für die Antefixation am meisten geeigneten Stelle der Corpushinterwand anheftete. So können wir die Baldy'sche Methode nur als eine Modifikation der Webster'schen ansehen. Die Methode, wie sie heute zumeist ausgeführt wird, d. h. Durchstoßen der Ligg. lata, Vereinigen der beiden Ligg. rott. und Anheften derselben an der Rückseite des Corpus uteri, wird daher zweckmäßig als Webster-Baldy'sche Methode angesprochen.

Befonderer Wert muß m. E. auf die Beibehaltung des Namens Webster als Schöpfer des Prinzips gelegt werden, dem nach Belieben der Name des Autors einer Modifikation hinzugefügt werden kann, z. B. Baldy, Guggisberg, Pollak, Alfieri, Stolz, Hirsch und anderen. Berkeley und Bonney sprechen in ihrem: „A Textbook of gynecological Surgery“ ganz einfach von der „Sling-operation“, ohne überhaupt einen Autorennamen hinzuzufügen.

Wesentlich ist, daß beide amerikanischen Autoren das Lig. latum unterhalb des Lig. ov. propr. durchbohren. Stöckel spricht etwas unklar von Durchziehen unterhalb des Tubenbündels; aus der beigefügten Abbildung geht aber hervor, daß auch er unterhalb des Lig. ov. propr. durchgeht. Franke und Guggisberg dagegen ziehen die runden Mutterbänder ausdrücklich durch die Mesosalpinx. Hierin aber sehen wir eine große Gefahr für die Tuben, die bei einem solchen Vorgehen leicht abgeknickt werden können. Daß diese Gefahr unnötig vergrößert wird durch das Verfahren nach Stolz, der sogar die Ligg. rott. über die Tuben hin-

wegzieht, braucht hier nicht besonders betont zu werden. Natürlich muß man auch bei dem Webster-Baldy'schen Verfahren sorgfältig jedes Mitzerren der Tuben vermeiden. Dadurch würde das Lumen der Tube verändert, und das befruchtete Ei würde leichter eine Nidationsmöglichkeit haben, die Frau wäre zur Extrauterin-gravidität disponiert.

Die Gefahr der Extrauterin-gravidität wird besonders von italienischer Seite oft hervorgehoben. Deshalb wird auch geraten, das Baldy'sche Verfahren fallen zu lassen und statt dessen die Methode nach *P e s t a l o z z a* oder *Alfieri* anzuwenden. Das *Pestalozza'sche* Verfahren unterscheidet sich von dem nach Webster-Baldy lediglich dadurch, daß der Italiener über die retrouterin fixierten runden Bänder noch die *Plica vesico-uterina* hinwegzieht. *Alfieri* beschrieb die sog. endoperitoneale Bandverkürzung. Er löst die runden Mutterbänder aus ihrer peritonealen Verkleidung, durchtrennt sie, wie zuerst auch Baldy und näht sie in einem Kanal der Uterushinterwand ein. So elegant diese Methode auch sein mag, so sehen wir doch keine wesentlichen Vorteile gegenüber dem Webster-Baldy; insbesondere kann ich nicht finden, inwiefern die Gefahr der Tubenabknickung bei einem derartigen Vorgehen vermindert sein sollte. Außerdem ist in der Literatur kein Fall bekannt, bei dem die Extrauterin-gravidität eindeutig als eine Folge der Webster-Baldy'schen Operation angesehen werden müßte. Jedenfalls sollte man sich hüten, kleine Gefahren, die ohnehin bei einiger Sorgfalt im Operieren auf ein Minimum reduziert sind, dadurch zu bannen zu versuchen, daß man die Operationsmethode mehr und mehr kompliziert und dadurch nur neue Gefahren unnötig heraufbeschwört.

Wie und wo soll die retrouterine Schlinge nun befestigt werden? Webster schreibt hierüber: „... the round ligament is carried across the back of the uterus a short distance above the utero-sacral ligaments and is the stitched in this position with chromic catgut...“

Baldy schreibt:

„... the liagments are then brought together forming a loop behind the uterus. A silk stitch now binds the round ligaments together and the forceps is removed. The uterus is now held well forward by the finger of the assistant, while the operator forces the round liagment as low on the posterior side of the uterus, as he desires and stitched it to the peritoneum of the uterus at this point with fine silk. This is about at the internal os or lower.“

Webster und Baldy stimmen also darin überein, die Ligg. rott. möglichst tief am Uterus anzuheften. Dagegen wurde von

verschiedenen Seiten geltend gemacht, daß bei einer so tiefen Fixierung der Fundus uteri doch über die umschnürenden Ligg. rott. hinweg zurücksinken könne, und somit das Ergebnis der Operation durch die tiefe Anheftung in Frage gestellt würde. Deshalb wurde vorgeschlagen, die Schlinge mehr an der Corpus-Fundusgrenze zu befestigen. Eine genaue Anheftungsstelle läßt sich natürlich nicht allgemein festlegen; das bleibt dem Gefühl des einzelnen Operateurs weitgehend überlassen. Wir suchen die Stelle, an der wir ein Optimum an Elevation, Anteversion und Anteflexion feststellen und fixieren dort. In den meisten Fällen findet sich diese Stelle in der Gegend der Corpus-Cervixgrenze. Ein Zurücksinken des Fundus uteri über die umgebende Schlinge hinweg haben wir in keinem Falle beobachtet.

Manche Operateure ziehen bewußt die Ligg. rott. nicht so weit nach hinten, daß sie sich berühren, sondern begnügen sich mit der Anheftung am lateralen Teil des Uterus, weil sie sonst eine Störung einer eventuellen Schwangerschaft befürchten; diese Befürchtung ist wohl unbegründet. Wir haben bei keiner unserer Operierten deswegen eine Störung der Schwangerschaft oder der Geburt gesehen, noch sind solche Fälle in der Literatur zu finden.

Baldy näht die Schlinge nur am Peritoneum des Uterus an. Das dürfte nach unserer Meinung etwas knapp gefaßt sein; wir jedenfalls ziehen unsere Nähte mit großer Nadel tief durch das Myometrium.

Von großer Bedeutung ist auch die Wahl des Nahtmaterials. Wie aus dem Bericht Websters hervorgeht, benutzt er Catgut, Baldy dagegen näht mit dünner Seide. Franke berichtet uns, daß er im Anfang mit Catgut nähte, später aber, als er dadurch mehrere Recidive bekam, ging er zur Verwendung von Seide über. Es ist das Verdienst Frankes, auf diesen wichtigen Unterschied hingewiesen zu haben. Wir benutzen zu unseren Fixationen jetzt stärkste Seide, da wir einen Teil unserer Recidive auf die Verwendung zu dünner Seide zurückführen, denn vor einigen Jahren nähten wir auch noch mit dünner Seide.

Die oben dargestellten, bisher ziemlich unklaren Begebenheiten, die zur Entstehung und Vervollständigung der Operation beitrugen, lassen es natürlich erscheinen, daß sich diese ganze Unsicherheit bezüglich Benennung und genauer Technik auch in der vorhandenen Fachliteratur widerspiegelt.

Der Priorität Websters wird das Stöckel'sche Handbuch in etwa gerecht. Auch wird in der Abbildung — wenn auch offensichtlich unbewußt, — das Original-Websterverfahren abgebildet.

Unrichtigkeiten sind infofern vorhanden, als es in dem Buche heißt, Franke habe 1901 unabhängig von Webster dieselbe Methode veröffentlicht. Eine Publikation Franke's erfolgte unwiderruflich erst im Jahre 1909, so daß Webster nicht nur in der Ausführung, sondern auch in der Reihenfolge der Veröffentlichungen bei weitem die Priorität zusteht. Ferner hat nicht Baldy unabhängig von Webster die Methode ausgearbeitet, sondern bei völliger Kenntnis der Veröffentlichung Webster's dessen Methode lediglich modifiziert.

Von Interesse sind weiter einige Unstimmigkeiten, die in einigen Büchern zwischen dem Text und der Abbildung bestehen, die auch auf der Unkenntnis von der Entwicklung dieser Operation beruhen. Ich greife für diese Beispiele nur einige der gebräuchlichsten Bücher heraus: Das Stöckel'sche Lehrbuch der Gynäkologie beschreibt genau das Verfahren nach Baldy (besser würde es heißen: Webster-Baldy), die beigelegten Abbildungen zeigen jedoch das reine Websterverfahren, d. h., man sieht eindeutig aus der Abbildung wie zuerst das eine Lig. rot. angenäht worden ist, und dann erst das andere Band durch das Lig. latum hindurchgezogen wird. Ähnlich ist dies in der gynäkologischen Operationslehre von Halban: er spricht im Text vom Baldy'schen Verfahren, bildet aber in der dazugehörigen Zeichnung das Verfahren nach Webster ab. In demselben Buche ist noch eine weitere Unrichtigkeit festzustellen: in der Quellenangabe zu dieser Operation beruft sich Halban auf die Publikation Baldy's aus dem Jahre 1902; zu dieser Zeit hat aber Baldy — wie oben erwähnt — nur die später von ihm wieder verlassene Methode mit Durchschneidung der runden Mutterbänder beschrieben.

Um die Entwicklung der Webster-Baldy'schen Operation und ihre technische Ausführung genau zu zeigen, füge ich meiner Arbeit einige Bilder bei, die bisher in keinem deutschen Buche zu finden sind.

Die erste Abbildung ist eine Wiedergabe der Skizze, die Webster seiner Originalveröffentlichung beifügte. Charakteristisch an dem Bilde ist folgendes: Webster geht unterhalb des Lig. ov. propr. durch; er vereinigt die beiden Lig. rot. nicht primär, sondern näht sie nacheinander auf dem Corpus uteri an; ferner — eine Besonderheit Websters — wird das Lig. rot. noch jederseits mit dem Rande der Öffnung vernäht, die man in das Lig. latum gemacht hat, um ein Durchschlüpfen der Därme zu vermeiden. Zu beachten ist die große Distanz zwischen der Tube und der Durchtrittsstelle der Ligg. rott.

Die zweite Abbildung habe ich ebenfalls nach dem Bilde ge-

zeichnet, das der Originalarbeit B a l d y's aus dem Jahre 1902 beigegeben ist. Es kommt mir hierbei darauf an, zu zeigen, wie B a l d y die Ligg. rott. durchschnit und dann die peripheren Abschnitte auf die Rückseite des Uterus verlagert. Die Abbildungen 3—5 habe ich gezeichnet nach Skizzen aus dem Buche von A s h t o n : A Textbook on the Practice of Gynaecology, dem einzigen Buche, das neben der Originalarbeit B a l d y's diese Operation abschnittweise in einzelnen Bildern richtig darstellt; sie zeigen die Ausführung der Operation, wie sie B a l d y 1903 vorgeschlagen hat. Abbildung 3 zeigt das Erfassen der runden Mutterbänder von rückwärts. Deutlich ist hier an allen drei Abbildungen dargestellt, wie die Amerikaner unterhalb des Lig. ov. propr. durchgehen. Von besonderer Wichtigkeit ist die Abbildung 4. Man sieht hieraus deutlich, wie die Schlinge gebildet ist; sie ist noch nicht am Uterus fixiert und kann daher in der Höhe noch verschoben werden. Ich habe das durch die beiden Pfeile angedeutet. Erst wenn man die richtige Höhe gefunden hat, wird die Schlinge in der Mitte und an den Seiten fixiert. Auch wir führen die Operation in dieser Weise aus, nur ziehen wir gewöhnlich die Schlinge mehr in die Cervixgrenze herunter, als es Ashton abbildet.

Ich hoffe, durch die Abbildungen meinen Zweck erreicht zu haben, die Prinzipien der Operation und die Etappen ihrer Entwicklung klar und eindeutig zu demonstrieren!

Die mechanische Wirkungsweise dieser Operation ist nicht eindeutig geklärt. B a l d y sagt dies auch mit den Worten: „The mechanism is plain, but has never to my knowledge been fully appreciated or fully pointed out even by Webster, who has for the same length of time performed an operation with exactly the same principles but varying slightly in technique.“ Er versucht dann später eine Erklärung zu geben: Der Uterus wird in seiner Höhe gehalten durch die ihn umgürtenden Ligg. rott. Die Ovarien und Tuben werden hochgehalten durch das unter dem Lig. ov. propr. durchziehende Lig. rot. Die Antelexion, die unter normalen Umständen durch den Tonus des Uterus selbst garantiert ist, wird nun aufrechterhalten durch den Bauchdruck, der wieder auf die Hinterfläche des Uterus einwirken kann, nachdem man durch die Lagekorrektur die Anteversioflexio wieder hergestellt hat. Unterstützend halten natürlich auch die den Uterus umklammernden runden Mutterbänder diesen in Antelexio, besonders dann, wenn man die Schlinge am Corpus uteri annäht. Je mehr allerdings die Schlinge nach dem Fundusteil verlagert wird, um so geringer kann der Uterus eleviert und antevertiert werden. Gerade das richtige Abwägen zwischen diesen drei Faktoren ist für den Erfolg der Ope-

ration und des Operators von nicht geringer Bedeutung. Die ganze Stützkonstruktion der Ligamentschlinge wird gefestigt durch den Teil des Lig. rot., der von den Cornua uteri zu der vorderen Bauchwand zieht. Somit läge die stärkste Belastung der Ligg. rott. an der vorderen Bauchwand und an der Durchtrittsstelle durch das Lig. latum. Eine Dehnung und eine Insuffizienz an dieser Stelle hat B a l d y jedoch nie beobachten können. Z i m m e r m a n n hingegen betont ausdrücklich, daß bei feinen Recidiven in keinem Falle eine Nahtinsuffizienz vorlag, sondern immer eine deutliche Dehnung der Ligg. rott. Trotzdem ist aber wohl von allen Operationen, die die R.V.F. durch eine Verkürzung der Ligg. rott. zu beheben suchen, die W e b f e r - B a l d y'sche diejenige, die dank ihrer gediegenen Stützkonstruktion das Lig. rot. am wenigsten belastet.

Durch die W e b f e r - B a l d y'sche Operation wird der Uterus weitgehend in seine natürlichen Verhältnisse zurückgebracht. Er liegt in vorzüglicher Anteversioflexio, seine physiologische Beweglichkeit nach allen Richtungen ist gut erhalten. Der Fundus reicht bis zur Ileo-pectinallinie oder etwas darüber hinaus. Unverständlich erscheint, wie gerade dieser letzte Punkt gegen diese Operation ins Feld geführt wird, wie dies durch B e r k e l e y und B o n n e y geschieht: „... This operation is an alternative to that (der Doléris'schen Operation, d. Verf.) just described, to which, however, it is inferior, because, through it corrects retroversion, it leaves the uterus low down in the pelvis...“. Der Uterus ist doch ein Organ des kleinen Beckens, und die Tatsache, daß auch nach der Operation die normale Topographie gewahrt bleibt, kann m. E. niemals gegen sondern nur in hohem Grade für die Operation sprechen.

Ein Vorteil dieser Methode besteht auch darin, daß sie nicht an Kanälen des Körpers angreift, die schon physiologisch einen locus minoris resistentiae darstellen, und somit eine weitere Schwächung dieser Stellen unbedingt vermieden wird (z. B. der Canalis inguinalis bei der A l e x a n d e r - A d a m'schen Operation).

Man schafft durch diese Operation keine widernatürlichen Fixationen der Gebärmutter (wie dies z. B. bei der Ventrofixationsmethode der Fall ist), und der Eingriff verursacht keine postoperativen Adhäsionen, die später Beschwerden machen könnten.

Es ist ein weiterer Vorteil dieser Methode, daß gleichzeitig mit der Antefixation des Uterus die gleichfalls descendierten Ovarien eleviert werden. Dadurch, daß das Lig. latum mit seinem ganzen oberen Teil nach vorn geschwenkt wird, gelangen die Ovarien wieder in ihre ursprüngliche physiologische Lage, i. e. hinten oberhalb der Parametrien. Von amerikanischer Seite wird gerade diesem

Descensus ovarii eine erhöhte Bedeutung für das Zustandekommen der Retroflexionsbeschwerden lokaler Art beigemessen. Die Tatsache, daß viele Frauen kurz nach ihrer Verheiratung wegen ihrer vorher symptomlosen R.V.F. zum Arzt geführt werden, spricht dafür, daß die nun auftretenden Schmerzen auf eine durch das einsetzende Geschlechtsleben bedingte Reizung der descendierten Ovarien zurückzuführen sind. Diese Meinung hat jedenfalls mehr Wahrscheinlichkeit als die von N a c k, C l a r e, nach dessen Meinung die typischen R.V.F.-Beschwerden durch eine Kompression der Ovarialvenen durch die Ligg. rott. zustande kommen sollen.

Einige Recidive, die wir nachher wieder in unsere Behandlung bekamen, wiesen uns ferner auf einen überragenden Vorteil unserer Methode hin. Dadurch, daß man einerseits weder irgendein Hilfsmittel zur Befestigung des Uterus verwendet, das nicht physiologisch schon zum Halte- bzw. Stützpunkt der Genitalien dient und andererseits auch keine Verkürzungen an Bändern und Peritoneum vornimmt, hat man im Falle eines Recidivs wenigstens die Aussicht, eine vollständige Restitutio ad integrum zu erhalten. Wir konnten dies bei einigen Frauen beobachten (s. die Krankengeschichten Nr. 11 und 12).

Was für starke Veränderungen durch Adhäsionen und Abknickungen nach der Anwendung anderer Methoden zustande kommen können, wurde uns in zwei Fällen klar, in denen wir ein Recidiv nach einer auswärts ausgeführten Operation beseitigen konnten (vgl. die Operationsberichte der Krankengeschichten Nr. 13 und 14!).

Wir haben in keinem unserer Fälle bei der Relaparotomie noch irgendeine Öffnung im Lig. latum sehen können. Das Lig. rot. zog sich nach der Nahtinsuffizienz wieder durch den Schlitz im Lig. latum zurück, und diese Stelle war so gut verheilt, daß es uns in keinem Falle möglich war, die frühere Durchtrittsstelle aufzufinden. P e m b e r t o n und S a g e r allerdings veröffentlichen einen Fall, wo man zwölf Jahr p. o. noch zwei Finger durch diesen Schlitz hindurchstecken konnte. Über einen ähnlichen Befund berichtet auch R i c h a r d s o n. In einem solchen Falle ist natürlich die Gefahr einer Darmeinklemmung offensichtlich. Tatsächlich fanden P e m b e r t o n und S a g e r einen Ileus, der dadurch entstanden war, daß Darm durch den Schlitz des Lig. latum hindurchgeschlüpft war, und so eine innere eingeklemmte Hernie hervorgerufen wurde. Diese Erscheinung läßt aber die Vermutung aufkommen, daß in das Lig. latum ein größeres Loch geschnitten wurde als unbedingt für den Durchtritt der runden Bänder notwendig war. Wir durchstoßen — wie oben schon gesagt wurde —

das breite Band mit einer schmalen Klemme und ritzen nur bei besonders derbem Lig. latum mit dem Scalpell die Stelle ein wenig ein. Im übrigen sind aber nur ganz vereinzelte Fälle von Ileus nach W.B. beobachtet worden. Auch wir haben eine Patientin durch Ileus verloren; es handelte sich aber um einen Adhäsionsileus (vgl. Krkg. Nr. 15).

Über die Resultate und damit den Wert der Webster-Baldy'schen Operation liegen nicht sehr viele Urteile vor. In Amerika wird die Methode allgemein gelobt, während gerade in Deutschland die Meinungen geteilt sind. Eden-Lockyer schreiben: „The Baldy-Webster, or sling operation is deservedly popular, and has many enthusiastic adherents...“; Kritzler dagegen stellte 1921 fest, daß die W.B.'sche Operation trotz ihrer Vorzüge und ihrer ausgezeichneten Resultate in Deutschland merkwürdigerweise nur sehr langsam an Boden gewinne.

Die bisher zahlenmäßig größte Statistik wurde in der Heynemann'schen Klinik in Hamburg zusammengestellt. Dort wurden 123 nach W.B. operierte Frauen nachuntersucht. Von diesen Frauen lag der Uterus vor der Operation bei 59 Frauen retroflektiert, bei 64 anteflektiert; in den letzten Fällen wurde der Uterus im Anschluß an andere gynäkologische Operationen — zumeist wohl ein- oder beiderseitige Adnexexstirpation — antefixiert. Auch wir haben diese Maßnahmen, die ich als prophylaktische Antefixation bezeichnen möchte, in einigen Fällen getroffen (vgl. Krkg. Nr. 16). Auch Stöckel empfiehlt die Antefixation nach Adnexexstirpation, und nach seiner Meinung kann die Haltbarkeit einer Antefixation außerordentlich gut geprüft werden nach Adnexenxstirpationen und zwar besonders nach einseitigen. Von den 123 Nachuntersuchungen Heynemanns war die Operation 95mal beidseitig und 28mal einseitig gemacht worden. 65 Frauen wurden vollkommen beschwerdefrei; es kam einmal eine extrauterine und 14mal eine intrauterine Schwangerschaft zustande; 6 Frauen davon abortierten. Mit Ausnahme von zwei Retroversionen (d. f. 1,6%) fand Heynemann überall ein gutes orthopädisches Resultat.

Eine ähnliche Statistik veröffentlichte Otto. Er führte die Methode in zwei Jahren 112mal aus und untersuchte davon 60 Frauen nach. Er fand kein Recidiv, in 56 Fällen ein gutes und in 4 Fällen ein ausreichendes Resultat. 8 Frauen machten p. o. eine Geburt durch, 2 abortierten. Es wurde auch p. p. kein Recidiv gesehen.

Thury konnte über 115 nach W.B. operierte Frauen berich-

ten. Auch er hebt die guten Resultate hervor. 4 der operierten Frauen wurden schwanger, und Thury betont den völlig störungslosen Verlauf der Schwangerschaften und der Geburten. Zwei Todesfälle hat er zu beklagen, von denen der eine durch Embolie und der andere durch Ileus verursacht war.

Gerich (Riga) berichtet 1929 über 81 Operationen nach W.B. Er hat allerdings keine Nachuntersuchungen vorgenommen; lediglich durch Zufall sind ihm zwei Recidive bekannt geworden. Statistisch hat daher dieser Bericht keine große Bedeutung.

Guggisberg stellte bei 34 Nachuntersuchungen, die $\frac{3}{4}$ bis zwei Jahre p. o. erfolgten, nur ein Recidiv fest, d. i. 3%. Pollack berichtet nur von 50% guten Resultaten, während Grechen wieder das W.B.-verfahren auf Grund seiner Erfolge empfiehlt.

Eine besonders interessante Aufstellung wurde von Zimmermann gemacht. Um einen Vergleich zwischen den verschiedenen Antefixationsverfahren zu ermöglichen, führte er mehrere Methoden nebeneinander an einem großen Material aus. Bei diesem Vergleich steht die Methode nach W.B. denkbar ungünstig. Während er kurze Zeit nach der Operation nur 1,7% Recidive fand, waren nach Verlauf von zwei Jahren 28% Recidive festzustellen. Es handelt sich um 36 Fälle. Zimmermann betont, daß in allen Fällen die Fixation eine gute geblieben war, nur die Ligg. rott. waren gedehnt. Von anderen Autoren wurde niemals eine Dehnung der Ligamente beobachtet. Wir führen jedenfalls die weitaus größte Zahl unserer Recidive auf Verfallen der Nähte zurück und fanden diese Vermutung auch in einigen Fällen bestätigt. Eine Dehnung der Ligg. rott. haben wir jedenfalls niemals gesehen.

Zum ersten Male wurde die Webster-Baldy'sche Methode von uns im Oktober 1924 ausgeführt und die letzte der in dieser Aufstellung berücksichtigten Operationen am 7. 9. 35. Ausnahmslos wurden alle in dieser Zeit von 1924—1935 nach W.B. operierte Frauen in die Tabelle aufgenommen. Die tabellarische Zusammenstellung ergibt folgende Einzelheiten (vgl. Tabelle Nr. 1):

In einem Zeitraum von annähernd 11 Jahren wurde die Webster-Baldy'sche Operation bei uns in 317 Fällen angewandt. Die jüngste der Operierten zählte 16, die älteste 53 Jahre.

Nahezu ein Drittel der Frauen waren im Alter von 26—30 Jahren, ein Zeichen dafür, eine wie große Rolle das Geschlechtsleben für das Zustandekommen resp. für eine Verstärkung der durch eine R.V.F. hervorgerufenen Symptome spielt. Dies erklärt sich vielleicht dadurch, daß zu der venösen Stauungshyperämie, die bei R.V.F. uteri meist im inneren Genitale schon besteht, oft noch

eine aktive, reflektorisch durch sexuelle Erregung bewirkte Hyperämie des ganzen äußeren und inneren Genitales hinzukommt.

Den geringsten Anteil an den Operationen stellen die Frauen von 41—50 Jahren; dies hat wohl seinen Grund z. T. in dem in diesen Jahren bei der Frau einsetzenden Abebben der Geschlechtsfunktionen und damit auch des Geschlechtslebens, z. T. aber auch darin, daß wir in diesem Alter meist eine andere Therapie einschlagen, wie ich oben bereits erwähnt habe.

Alter	Gesamtzahl	R. V. F. fix.	Appendicitis chron.	keine Appendektomie gemacht	Descens. uteri et vaginae	Dammplastik	Komplizierende Befunde, die gleichzeitig behoben wurden	Frauen, die p. o. gebaren
16—20	28	3	5	1	2	—	10	1
21—25	91	23	12	6	1	—	29	13
26—30	100	27	13	9	13	4	19	22
31—35	59	19	7	4	8	2	14	5
36—40	29	4	2	2	9	2	5	5
41—50	9	3	1	—	2	—	1	1
über 50	1	—	1	—	—	—	1	—
	317	79	41	22	35	8	79	47

Tabelle I

Von den in den folgenden Spalten der Tabelle angegebenen anderen Erkrankungen des Genitales, die neben der R.V.F. gefunden wurden, kamen natürlich oftmals bei einer Frau mehrere Erkrankungen nebeneinander vor, wie dies ja auch bei einer Addition der Teillummen der einzelnen Spalten offensichtlich wird.

Eine R.V.F. fixata wurde in 79 Fällen festgestellt, d. h., in 25%. Hierzu sind nur die echten fixierten gezählt, nicht etwa die palpatorisch als fixiert imponierenden incarcerierten Fälle. Die Art der Fixation war je nach ihrer Entstehungsurfläche natürlich eine verschiedene. Die meisten Adhäsionen entstehen entweder im Anschluß an eine Entzündung, die durch ascendierende Infektion — meist Gonorrhoe — hervorgerufen wurde, oder sind anzufehen als Endzustand nach einer lokalisierenden partiellen Peritonitis, die ihrerseits wieder Folge einer Appendicitis oder Perityphlitis sein kann.

Aus ihrem Aufbau und Aussehen kann man mit einiger Wahrscheinlichkeit Schlüsse über die Genese der Verwachsungen ziehen. Die Adhäsionen auf appendicitischer Grundlage sind mehr organisiert und daher derber als die, die infolge der ascendierenden Infektion sich gebildet haben. Außerdem bilden sie mit Vorliebe Darmverwachsungen. Die Gonorrhoe hat dagegen mehr zarte, schleierartige Verwachsungen im Gefolge; derbere Verwachsungen bilden sich lediglich zwischen der Uterushinterwand und dem Douglasperitoneum aus; außerdem hinterläßt sie meist das Bild einer abgelaufenen Pyosalpinx. Die Gonorrhoe verschließt daher die Tube auch meist am Isthmus, während die Appendicitis bzw. Pelveoperitonitis eine Verklebung des Fimbrienendes bewirkt. In jedem Falle ist Sterilität die Folge, jedoch ist deren Behebung im ersten Fall ungemein schwer, wenn nicht gar unmöglich, da die Zerstörung der Tube meist eine vollständigere ist. Rein chirurgisch gesehen, sind allerdings die appendicitischen Adhäsionen unangenehmer, weil sie ja wesentlich fester sind.

An unseren operierten Frauen konnten wir außerordentlich häufig die Residuen einer abgelaufenen, auch akuten Appendicitis und der dieser oft folgenden Peritonitis sehen. Diese Tatsache ist wohl darauf zurückzuführen, daß einerseits die akute Appendicitis bei der Frau unter weniger stürmischen Erscheinungen verläuft als beim Manne, und daß andererseits bei Schmerzzuständen im Unterleib sowohl von seiten der Patientin als auch von seiten des Arztes weniger schnell und eindeutig eine Appendicitis vermutet wird resp. diagnostiziert werden kann. Mit Rücksicht auf die oft schwerwiegenden Folgen, die eine abgelaufene Appendicitis für das Genitale der Frau haben kann, tut man gut daran, bei Verdacht auf Appendicitis zu operieren. Daher soll bei der Frau die Indikation

zur Appendektomie nicht wie beim Manne eine *indicatio vitalis* sein sondern eine *indicatio sexualis* und ist als solche weiter zu fassen.

Die R.V.F. fixata kann sowohl direkt durch Schrumpfung und Verziehung aus der normalen Lage entstanden sein als sekundär durch entzündliche Vorgänge in und um den schon retroflektierten Uterus. Verwachsungen können auch vorkommen auf Grund entzündlicher Veränderungen der Ovarien, die ihrerseits wieder auf die durch die R.V.F. bedingte Stauung in den Ovarialgefäßen zurückgeführt werden können. Wenn eine *Infectio veneris* nicht vorlag, und die Adhäsionen nicht sehr fest sind, kann man sie sich auf die eben geschilderte Art entstanden denken; in einem solchen Falle sind die Adhäsionen offensichtlich eine mittelbare Folge der Retrodeviation des Uterus. Die Meinung älterer Gynäkologen, daß eine Nekrose des Serosae epithels aufträte an den Stellen, an denen der Uterus unbeweglich retroflektiert parietales und viscerales Blatt des Peritoneums aneinanderpreßt, und somit die Fixationen ebenfalls eine direkte Folge der Lageveränderung wären, wird heute von den meisten Gynäkologen nicht mehr geteilt.

Der größte Teil der Fixationen bei der R.V.F. kann jedenfalls als sekundär entstanden angesehen werden; es erhebt sich nun eine Frage, die von größter praktischer Bedeutung ist: Ist der retroflektierte Uterus einer ascendierenden Infektion leichter zugänglich als der ante flektierte? Wenn auch diese Frage nicht eindeutig beantwortet werden kann, so neigt man im allgemeinen doch eher zu einer Bejahung dieser Frage. Es ist einleuchtend, daß der Uterus durch die venöse Stauung nicht im Besitze seiner vollen Abwehrkräfte gegen die eindringende Infektion ist, und daß ferner die aufsteigenden Bakterien in dem oft endometritisch veränderten Uterus einen günstigen Nährboden finden.

Bei 13% unserer operierten Frauen fand sich eine deutliche *Appendicitis chronica*. Ätiologisch machen wir dafür die bei R.V.F. oft vorhandene Obstipation verantwortlich.

Wie bereits betont, führen wir im Anschluß an die W.B.'sche Operation gleich die Appendektomie aus. Bei 22 Frauen fiel dieser zusätzliche Eingriff aus, da sie bereits appendektomiert waren.

Trotzdem in 35 Fällen ein deutlicher Descensus bzw. Prolapsus uteri (und auch oft vaginae) bestand, brauchten wir doch nur in acht Fällen eine Dammplastik anzuschließen. Dies spricht deutlich für die hervorragende Elevation, die man durch die W.B.-Methode erreichen kann (vgl. Krkg. Nr. 4 und 17). Auch Franke hebt die elevatorische Wirksamkeit dieser Methode hervor.

In einer erstaunlich hohen Zahl von Fällen fanden wir noch Veränderungen am Uterus oder den Adnexen, die dann gleich gelegentlich der Laparotomie behoben werden konnten. Bei 79 Frauen (d. f. 24,9%) wurde damit die einfache Antefixation komplizierter gestaltet. Wenn wir auch eine große Anzahl von pathologischen Adnexbefunden hatten, so können wir doch nicht bestätigen, was die Schweiz. Med. Wochenschrift brachte, nämlich, daß unter einer großen Anzahl von Laparotomien die Adnexe nur in 21,8% der Fälle als normal befunden wurden. Bei uns handelt es sich bei den Nebenfunden in der Hauptsache um Erscheinungen wie Parametritis, Salpingitis, Cystoma ovarii, Descensus ovarii und Myomata uteri. Ribbert betrachtet die Hyperämie als auslösendes Moment für die Weiterentwicklung vorhandener Myomkeime. Es erscheint deshalb nicht ausgeschlossen, daß ein Zusammenhang zwischen der durch die R.V.F. bedingten Hyperämie des Uterus und den häufig gefundenen Myomata uteri besteht. Auch ist nicht ganz von der Hand zu weisen, daß durch eine starke Hyperämie eine maligne Entartung des Gewebes begünstigt werden kann, wie es ja auch eine bekannte Tatsache ist, daß der Leistenboden in vielen Fällen zu maligner Degeneration neigt.

Jahr	Anzahl der Operationen	Recidive	%
1924	4	—	2,2
1925	16	—	
1926	24	1	
1927	39	3	8,8
1928	29	3	
1929	33	1	
1930	42	3	5,1
1931	37	1	
1932	24	2	
1933	31	1	14
1934	25	—	
1935	13	—	
11 Jahre	317	15	4,7 %

Tabelle II

In der zweiten Tabelle finden sich die Operationen nach Jahren geordnet. In der Spalte „Recidive“ findet sich die Anzahl der Recidive, die wir später unter den in dem betreffenden Jahre operierten Frauen fanden.

Stellt man sich die jeweilige Anzahl der Recidive graphisch dar, so erhält man eine dreizipflige Kurve, die je einen Gipfel im Jahre 1928, 1930 und 1932 aufweist. Diese Kurvenhöhepunkte decken sich auffallend mit den Zeitabschnitten, in denen ein Wechsel des Operateurs eingetreten war, so daß wir zu der Annahme geneigt sind, daß jeder der jeweiligen Operateure sich erst nach und nach die völlige Beherrschung der Technik angeeignet hat.

In den ersten drei Jahren, in denen bei uns die W.B.'sche Methode angewandt wurde, hat man die Fixation des Lig. rot. mit Seide gemacht. Diese Fälle wurden ausnahmslos durch Cramer operiert. Im Durchschnitt fanden sich 2,2% Recidive. Vom Jahre 1927 ab wurde ein Teil der Operationen auch von Assistenten ausgeführt. Gleichzeitig wurde versuchsweise zu Catgut als Nahtmaterial für die Ligamenta übergegangen. Die Zahl der Recidive betrug in den zwei Jahren, in denen wir Catgut verwandten, 8,8%.

Vom Jahre 1929 ab wurde wieder zur Fixation mittels Seide übergegangen. Da wir jedoch in den darauffolgenden Jahren trotzdem einige Recidive infolge Nahtinsuffizienz hatten, wurde vom Jahre 1933 ab die Annäherung der Ligg. rott. mit der stärksten Seide bewerkstelligt. Das Ergebnis dieser Umstellung zeigt sich deutlich in dem Verhältnis der Recidive in diesen beiden Zeiträumen, das 5,1 : 1,4% beträgt. Dabei ist allerdings die kürzere Beobachtungsspanne zwischen den beiden Zeiträumen zu berücksichtigen. Wahrscheinlich haben wir aber doch einen großen Teil der Recidivgefahr durch die Verstärkung unseres Nahtmaterials gebannt.

Die Gesamtzahl der Recidive beträgt 15, d. h. 4,7% unserer Operierten. Von den 15 Recidiven blieben 3 beschwerdefrei. Bei einem Recidiv fand sich der Uterus in Retroversio. Bei diesen vier Frauen haben wir somit ein funktionell gutes Ergebnis erreicht, wenn auch das orthopädische Resultat zu wünschen läßt. Es ist aber eine Heilung im weitesten ärztlichen Sinne erfolgt. Inwieweit eine gewisse psychische Komponente mitspielt, läßt sich allerdings nicht sagen. Ein Recidiv in funktionellem und orthopädischem Sinne liegt somit nur in 3,5% der Fälle vor. Zwei der Recidive erfolgten im Anschluß an eine Geburt.

Im Ganzen verloren wir zwei Patientinnen, deren eine an dem schon erwähnten Adhäsionsileus zugrunde ging, während die andere eineinhalb Stunde post operationem infolge plötzlich zunehmender

Kreislauffschwäche dem Operationschock erlag. Das entspricht einer Mortalität von 0,6%.

Als prophylaktische Maßnahme führten wir die W.B.'sche Operation in einem Falle bei anteflektiertem Uterus aus, in sechs Fällen nach einseitiger und in drei Fällen nach beidseitiger Adnexexstirpation.

Nach der Operation wurden 47 Frauen schwanger und gebaren. Dreimal wurden Zwillinge geboren; 12 von den 47 Frauen hatten mehr als eine Geburt. Mit Ausnahme einer Sectio caesarea wegen platt-rhachitischen Beckens kamen alle Frauen spontan nieder. Was könnte wohl besser die Güte dieser operativen Eingriffe dokumentieren als diese große Anzahl postoperativer Schwangerschaften und Geburten?

6 weitere Frauen wurden zwar schwanger, jedoch kam es aus uns unbekannten Gründen zum Abort. Die Gesamtzahl der Frauen, die nach der Operation noch ein- oder mehrmals concipierten, beträgt somit 62.

Zehn Frauen kamen wegen der ausdrücklichen Klage über Sterilität zur Operation. Sechs dieser Frauen concipierten (als Beispiel führe ich die Krankengeschichten Nr. 7 und 8 an) prompt post operationem. Fünf Frauen trugen die Schwangerschaft aus; nur eine Patientin hatte infolge einer schweren Grippe einen Abort (M. III.).

Unter unseren Operierten fanden sich vier Frauen, bei denen schon einmal eine operative Lagekorrektur des Uterus versucht worden war. Drei Frauen davon waren nach Alexander-Adams operiert worden. Bei einer von ihnen war wohl von vornherein der Alexander-Adams contraindiziert, da es sich — wie wir aus der Anamnese und dem Befund schließen mußten — mit großer Wahrscheinlichkeit auch schon vor der ersten Operation um eine R.V.F. fixata gehandelt hatte (vgl. Krkg. Nr. 10). Bei der vierten Frau war das Recidiv aufgetreten nach einer intra-abdominellen Bänderverkürzung nach Menge (vgl. Krkg. Nr. 13).

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Webster-Baldy'sche Operation eine Methode ist, die — unter möglichst geringer Beanspruchung des Bandapparates und unter weitgehender Wahrung der normalen Topographie der Beckeneingeweide — eine außerordentlich sichere Antefixation und Elevation des Uterus her-

beiführt und doch dieses Organ in keiner Weise in seiner physiologischen Excursionsbreite hemmt. die notwendig ist, um ein beschwerdefreies Arbeiten des Enddarms und der Blase zu ermöglichen. Es können sich keine Stränge und Taschen bilden, und damit ist die Gefahr der Darmeinklemmung bzw. -abknickung völlig gebannt.

Darüber hinaus kann man feststellen, daß selbst in der Zeit stärkster Beanspruchung des Genitales — der Geburt und der Schwangerschaft — niemals Störungen zu verzeichnen waren, die der Operation zur Last gelegt werden könnten, ja, man kann sogar sagen, daß man durch die Operation mancher Frau zu einem komplikationslosen Verlauf der Gravidität und der Geburt verhelfen kann.

Wir haben Gelegenheit gehabt, die meisten unserer operierten Frauen Jahre hindurch zu beobachten und glauben auch, uns auf Grund des ansehnlichen Umfanges unseres Materials ein Urteil bilden zu können. Die schönen offensichtlichen therapeutischen Erfolge, die wir bei der Anwendung der Webster-Baldy'schen Operation gehabt haben, bestätigen uns das Urteil, das schon Franke vor uns über diese Methode gefällt hat: sie ist wohl die Operation, die allen Anforderungen gerecht wird.

Trotz der auch anderwärts erzielten Erfolge und trotz der Einfachheit und Ungefährlichkeit ihrer Anwendung konnte sich diese Operationsmethode bisher nur wenig durchsetzen. Franke machte noch 1931 darauf aufmerksam, daß sie nicht einmal in einem großen Sammelreferat erwähnt war, das auf einem Chirurgenkongreß gehalten wurde. Sie ist vielen Gynäkologen vollkommen unbekannt und wird auch an vielen selbst großen Kliniken niemals ausgeführt.

Es wäre von großer Bedeutung, wenn an Hand größeren Materials und größerer Erfahrung das Urteil über die Webster-Baldy'sche Operation noch weiter geklärt und vervollkommen werden könnte.

Es sei mir auch an dieser Stelle gestattet, Herrn Prof. Dr. Cramer meinen Dank abzustatten für die freundliche Überlassung des Themas sowie für die Förderung der Arbeit durch seine Anregungen und lebenswürdige Unterstützung bei der Durcharbeitung des Krankenmaterials. Herrn Prof. Dr. Siebke bin ich für die Übernahme des Referates zu Dank verpflichtet.

Krankengeschichten.

(Gekürzt.)

Nr. 1. (312/25) Frau A. St. 28 Jahre, R.F. uteri fix.

Früher gesund. Vor $3\frac{1}{4}$ Jahren Partus. Seitdem Pessarbehandlung. Schmerzen bei der Periode, Dyspareunie.

Genitale: Vagina mittelweit, Portio mittelfständig, symphyfenwärts gerichtet; Corpus uteri im hinteren Scheidengewölbe etwas vergrößert fühlbar, fixiert.

Adnexe o. B.

3. 3. 25. Laparotomie: Löfung der Verwachsungen, Webster-Baldy, Appendektomie.

10. 3. Fäden gezogen.

18. 3. Vaginale Untersuchung: Lage des Uterus sehr gut. Entlassung.

Nr. 2. (682/26) Frau F. Sch. 32 J. R.F. uteri fix.

Mit 16 Jahren Lungenentzündung.

Nach der ersten Geburt (mit Wochenbettfieber) dauernd Beschwerden im Unterleib, die in den letzten Monaten erheblich zunahmen; besonders starke Kreuzschmerzen.

3. 8. 26. Operation in Pantopon-Scopolamin Mischnarkorfe: Laparotomie, Löfung der Adhäsionen, Webster-Baldy, Appendektomie.

10. 8. Wunde pp. geheilt, Fäden entfernt, Wohlbefinden.

17. 8. Patientin beschwerdefrei entlassen.

Nr. 3. (697/26) Frau E. K. 28 J. R.F. uteri, Descensus uteri, Appendicitis chronica.

Früher stets gesund gewesen.

Seit der Geburt des ersten Kindes Beschwerden im Unterleib, besonders während der Menfes. Zunahme der Beschwerden in letzter Zeit.

11. 8. 26 Operation: Webster-Baldy, Appendektomie.

18. 8. Fäden gezogen, Wunde pp. geheilt.

25. 8. Geheilt entlassen.

Nr. 4. (1565/29) Frau A. K. 34 J. Descensus ut. et vaginae.

Nie ernstlich krank gewesen. Menarche mit $14\frac{1}{2}$ J. Seit der Geburt des letzten Kindes Beschwerden. Periode war vorher immer regelmäßig. 28/4 Tage o. Beschw. 1922 Partus (Schädellage, Wochenbett fieberfrei). 1926 Partus (Schädellage, Wochenbett fieberfrei). Jetzige Beschwerden seit

der letzten Geburt: Rückenschmerzen, Ziehen im Leib, Gefühl der Senkung. Keine Störung der Blasen- und Darmentleerung. Periode unregelmäßig, alle 3—4 Wochen, 3 Tage anhaltend, nach 2 Tagen Pause wieder kurze Blutung. Nach der Menfes starker Ausfluß.

Zwei Jahre hindurch einen Ring getragen.

Genitalbefund: Vulva o. B. Hintere Vaginalwand beim Pressen tiefer-tretend; Vagina mittelweit; Uterus hühnereigroß, sehr beweglich, tritt beim Pressen tief herunter. Adnexe o. B. Elongatio colli.

6. 12. 29. Operation: Elevation und Antefixation nach Webster-Baldy, Appendektomie, Dammplastik.

21. 12. Uterus hochgezogen, eben zu erreichen, in guter Ante-versioflexio. Damm fest, Beckenboden in breiter Schicht geschlossen; Operationswunden pp. verheilt, reaktionslos.

Beschwerdefrei entlassen.

Nr. 5. (868/30) Frau H. H. 36 J. R.F. uteri fix.

1918 normaler Partus. Menfes immer regelmäßig, 28/5—6.

Oktober 1929 Abort. Seitdem Menfes etwas unregelmäßig 21,6—7 Tage. Blutverlust kaum vermehrt. Während der Menfes Kreuzschmerzen.

Genitale: Uterus leicht vergrößert, retroflektiert, nicht fixiert. Resistenz im Bereich der rechten Adnexe (Tumor?).

14. 6. 30. In Avertin-Äther Mischnarkose: Pfannenstielquerchnitt durch die fettreichen Bauchdecken. Peritoneum o. B. Uterus extrem retroflektiert, im Douglas fixiert. Rechte Tube auf Daumendicke geschwollen, geschlängelt, blaurot. Linke Tube am Isthmus nicht durchgängig. Am linken Ovar eine Corpus luteumcyste. Resektion beider Tuben. Stumpfdeckung durch Webster-Baldy.

Komplikationsloser Verlauf, geheilt entlassen.

Nr. 6. (814/35) Frau F. V. 23 J. R.V.F. uteri mobilis.

Immer gefund. Menarche mit 16 Jahren. Am 5. Januar 1935 Spontangeburt.

Seitdem ist die Periode viel länger und stärker als bisher (bislang 28/3, jetzt 28/8 Tage). Patientin fühlt sich immer schlapp; starke Gewichtsabnahme (30 Pfd.). Ziehende Schmerzen in Kreuz- und Leisten-gegend. Verstopfung und sehr starke ziehende Schmerzen bei der Defä-kation. Appetitlosigkeit; keine Blasenbeschwerden. Außerdem war die Patientin immer sehr stark erregt; sie hatte zu nichts mehr Lust, es war ihr alles zu viel.

Genitale: Vulva und Vagina mittelweit. Uterus extrem retroflektiert. Adnexe und Parametrien frei.

30. 7. Operation: Webster-Baldy, Appendektomie.

6. 8. Fäden gezogen, Wundheilung pp.

17. 8. Uterus in guter Lage, Pat. beschwerdefrei entlassen.

Letzte Periode ante operationem vom 11.—18. Juli.

Erste Periode post operationem vom 7.—10. August.

Nr. 7. (120/25) Frau A. v. d. H. 33 J. R.V.F. uteri, Sterilität.

Pat. hatte 1 Partus; wurde dann 1920 operiert (Cramer). Entfernung des linken Ovariums wegen Ovarialcyste. Kommt jetzt wegen Dysmenorrhoe und Sterilität.

Genitale: Portio gelapten, Corpus uteri im hinteren Scheidengewölbe tastbar, beweglich. Adnexe frei.

17. 1. 25. Operation: Linkes Ovar fehlt; Tuben beiderseits für Sonde durchgängig, rechtes Ovar o. B. Webster-Baldy, Appendix nicht mehr vorhanden.

31. 1. Pat. geheilt entlassen.

Patientin hatte später zwei glatte Geburten, davon einmal Zwillinge.

Nr. 8. (397/26) Frau L. St. 24 J. R.V.F. mob., Sterilität.

Immer gefund gewesen. Keinerlei Beschwerden, auch nicht bei den Menfes. Sterilität. Vor 1½ Jahren Tubendurchblafung.

Genitale: Introitus eng, Portio grubchenförmig, nach vorn gerichtet; Corpus retroflektiert, mobil.

4. 5. 26. Operation: Webster-Baldy, Appendektomie.

11. 5. Wunde pp. verheilt, Pat. geheilt entlassen.

Patientin hatte in der Folgezeit zwei glatte Geburten.

Nr. 9. (641/35) Frl. C. K. 17 J. Torfio, R.V.F. uteri.

Vor einem halben Jahr Sturz mit Fahrrad, Gehirnerfütterung. Anamnese sonst o. B.

Pat. wird nachts eingeliefert unter der Diagnose: Appendicitis, Ovarialerkrankung?

Befund: 17jährige Pat. in gutem K.E.Z. Haut hinreichend durchblutet. Abdomen: Druckschmerz in der Gegend des Mac-Burney und tiefer. Linke Seite ebenfalls druckschmerzhaft. Pat. hatte um 9 Uhr einen kolikartigen Schmerz in der linken Seite. Blutet seit der Zeit mäßig aus der Vagina. Temp. 37,3, Puls 82.

6. 6. 35 Wegen des ausgesprochen starken Druckschmerzes: Pfannenstielquerchnitt durch die straffe Bauchmuskulatur. Peritoneum reaktionslos. Uterus extrem im Douglas eingeklemmt und zwar um die Cervixachse gedreht, so daß die linke Tubenecke fest im Douglas sitzt. Starke Zerrung der rechtsseitigen Bänder und starke Einklemmung des Rectums. Es gelingt, den Uterus hervorzuziehen; er schwillt sichtbar ab. Webster-Baldy, Appendektomie, die Appendix reaktionslos. Adnexe beiderseits frei. Schließen der Bauchdecken in Schichten bei völliger Bluttrockenheit.

14. 6. Fäden gezogen, Wundheilung pp.

17. 6. Noch kleine Verhärtung oben rechts. Narbe reizlos. Auch vaginal keine Druckempfindlichkeit.

Beschwerdefrei entlassen.

Nr. 10. (514/28) Frau W. S. 21 J. R.V.F. uteri fixata.

Mit acht Jahren Bauchfelltb. Mit zehn Jahren Gelenkrheumatismus; mit 14 Jahren Lungentbc.

Mit 16 Jahren Appendicitis, Appendektomie.

Menarche mit 12 Jahren, Periode immer unregelmäßig. Deswegen mit 18 Jahren Alexander-Adams.

Im Februar 1927 normaler Partus; im Mai 1927 Abort (M. II); im August 1927 Abort (M. III). Seitdem starke Cohabitationsbeschwerden. Letzte Periode am 15. 4., schwächer als sonst, nur einen Tag dauernd. Letzte regelrechte Periode am 17. 3. 1927.

Genitale: Vagina eng, Portio zapfenförmig, sieht nach vorn. Uterus gut hühnereigroß, extrem retrovertiertflektiert.

8. 5. 28. In Scopolamin-Pantopon Mischnarkofe suprasymphysärer Fascienquerschnitt. Uterus über hühnereigroß, retrovertiertflektiert, mit der ganzen Hinterfläche verwachsen. Die Adhäsionen lassen sich stumpf lösen, worauf der Uterus sich nach vorn bringen läßt. Webster-Baldy.

19. 5. Beschwerdefrei entlassen.

Da eine Infectio veneris nicht vorgelegen hat, sind die Adhäsionen mit großer Wahrscheinlichkeit anzusehen als Residuen eines Douglasexsudates, das sich gelegentlich der Bauchfellthb. oder der Appendicitis gebildet hat. In jedem Falle aber ereignete sich die Fixierung vor der Ausführung der Alexander-Adams'schen Operation (d. Verf.)

Nr. 11. (837/34) Frau E. M. 24 J. R.F. (Recidiv nach W.B.).

1931 Webster-Baldy wegen R.V.F. uteri mobilis.

Jetzige Beschwerden: Starke Rückenschmerzen, Schmerzen in beiden Seiten und der Magengegend. Starke Menstruationsbeschwerden.

Genitale: Vulva und Vagina o. B. Uterus stark retroflektiert. Adnexe und Parametrien frei.

2. 8. 34. In Avertin-Äther Mischnarkofe: Pfannenstielquerschnitt in der alten reaktionslosen Narbe. Narbengewebe mäßigen Grades wird durchtrennt, Peritoneum reaktionslos. Bei der Eröffnung des Peritoneums zeigt sich der Uterus retroflektiert. Mit Ausnahme einer Eindellung an der Insertionsstelle des rechten Lig. rot. ist kein Anzeichen der früheren Antefixation mehr vorhanden. Typische Antefixation nach Webster-Baldy, Vernähen der Lig. rott. beiderseits auf der Uterusrückseite mit starken Seidenfäden. Schluß der Bauchdecken bei völliger Bluttrockenheit

18. 8. Patientin wird beschwerdefrei entlassen.

Nr. 12. (892/1935) Fr. E. B. 27 J. R.V.F. mobilis (Recidiv nach W.B.).

Pat. wurde am 12. Mai 1933 hier operiert wegen R.F. mob. (Webster-Baldy). Sie wurde beschwerdefrei am 26. 5. entlassen. Die vor der Operation bestehenden Beschwerden wie Poly- und Hypermenorrhoe, Schmerzen bei der Defäkation sowie die psychischen Veränderungen waren alle gebessert. Arbeitsfähig. Ein halbes Jahr später setzte gelblich-eitriger Ausfluß ein; Wundfein und Rhagadenbildung an der Scheide. Die Regel dauerte wieder acht Tage gegenüber drei Tagen nach der Operation. Die Schmerzen beim Stuhlgang traten wieder auf. Depressionen, Weinerlichkeit und Gereiztheit setzten wieder ein. Die Beschwerden gingen all-

mählich an und wurden immer stärker. Bei der Periode Kreuzschmerzen sowie Schmerzen in der Brust. Merkliche Gewichtsabnahme.

Gegen den Fluor waren draußen Spülungen und Tabletten verordnet worden; halfen aber nur vorübergehend.

16. 8. 35. In Avertin-Äther Mischnarkose: Pfannenstielquerchnitt in der alten Narbe. Peritoneum reaktionslos. Keinerlei Verwachsungen in der Bauchhöhle. Der Uterus liegt extrem retrovertiertflektiert, liegt mit Fundus tief im kleinen Becken. Keinerlei Veränderungen oder Vernarbungen an den Ligamenta. Hervorziehen des Uterus und Vernähen der Ligg. rott. mit kräftiger Seide nach Webster-Baldy. Schluß der Bauchdecken bei völliger Bluttrockenheit. Wundheilung pp., Pat. beschwerdefrei entlassen.

Nr. 13. (1130/24) Frau M. L. 24 J. R.F. mob., postoperative Verwachsungen.

Seit einiger Zeit Schmerzen in der linken Seite, bei Bewegungen auch ins linke Bein ausstrahlend. Erbrechen. Stuhl regelmäßig, Urindrang; leichte Blutungen aus der Scheide.

Pat. war vor drei Monaten auswärts vaginal operiert worden. Angeblich wurden die Bänder gekürzt. Kurz darauf traten die oben geschilderten Beschwerden auf.

Genitale: Vagina eng, Uterus wenig vergrößert, retroflektiert; links neben dem Corpus Resistenz fühlbar, die nicht abgrenzbar ist.

24. 10. 24. Operation: Pfannenstiel. Nach Eröffnung des Peritoneums hervorholen des retroflektierten Uterus. Knotige Verwachsungen von links bis auf den Fundus. Lösung derselben. Uterus wenig vergrößert. Das Omentum ist knotig und breit verwachsen mit dem Blasenfundus, mit dem parietalen Blatt des Peritoneums und mit dem vorderen und hinteren Blatt des Lig. latum, derart, daß es von der Scheide aus als Adnextumor imponierte. Völlige Lösung ist nicht möglich; wohl aber gelingt es, die ganz intacten Adnexe links treizulegen. Kürzung der Ligg. rott. nach Webster-Baldy. Appendektomie.

Patientin fühlt sich sehr wohl und wird entlassen.

Nr. 14. (555/26) Frau M. P. 31 J. R.V.F. fix. p.o. Adhäsionen.

1918 Appendektomie. 1920 Missed Abortion, Ausräumung. 1921 auswärts intraabdominelle Bänderverkürzung (nach Menge). 1923 wurde wieder eine totale R.R. festgestellt. Menfes alle drei Wochen ohne Beschwerden. Gynäkologischer Befund: Uterus retrovertiertflektiert, fixiert. Adnexe nicht mit Sicherheit auszutasten. 25. 6. Operation in Pantopon-Scopolamin Mischnarkose: Pfannenstiel, Eröffnung des Peritoneums. Netz in breiter Ausdehnung mit den Bauchdecken verwachsen. Lösung der Verwachsungen. Eingehen auf das Genitale. Die Blase ist breit mit dem Uterus und den Adnexen verwachsen und reicht über den Fundus uteri hinweg. Lösung der Adhäsionen. Dickdarm an der Uterushinterwand und den Adnexen adhären. Hervorholen des Uterus. Adnexe links frei. Webster-Baldy links. Rechte Tube vollkommen entzündlich verwachsen

mit einem kleinen reichlich cystisch veränderten Ovarium. Absetzen der Adnexe und Webster-Baldy rechts. Appendix nicht mehr vorhanden. Schichtnaht der Bauchdecken. Der Rest des Ovariums wird reimplantiert.

Glatte Wundheilungsverlauf, Wohlbefinden.

10. 7. Pat. geheilt nach Hause entlassen.

Nr. 15. (915/30) Fr. K. H. 23 J. R.F. fixata.

Nie ernstlich krank

Menarche mit 13 Jahren. Menfes regelmäßig alle 28/8 Tage; starke Blutung. Beschwerden dabei: Kreuzschmerzen, Schmerzen im Unterleib.

Seit etwa zwei Jahren außerhalb der Menfes zwei Tage wöchentlich Blutungen; in letzter Zeit etwas nachlassend.

Jetzige Beschwerden: Stuhl angehalten; seit dem 15. Jahr Stuhlgang nur auf Laxantien, sonst bis zu sechs Tagen kein Stuhlgang. Seit drei Jahren Fluor zwischen den Menfes; häufige Blutungen; Kopfschmerzen; Kreuzschmerzen. Appetit wechselnd; Gewichtsverlust.

24. 6. 30. In Avertin-Äther Mischnarkose: Pfannenstiel durch die fettreichen Bauchdecken. Peritoneum o. B. Uterus retroflektiert, im Douglas fixiert durch strangartige Verwachsungen, die manuell gelöst werden, Vereinigung der Ligg. rott. nach Durchführung durch das Lig. latum unter dem Lig. ov. propr. beiderseits und Vernähung auf der Hinterfläche des Uterus. Tuben beiderseits etwas verdickt, an der Einmündung in den Uterus obliteriert. Abtragung der linken Tube, breitere Eröffnung und Ausstülpung des Fimbrienendes rechts. Ausschälung eines Corpus luteum rechts. Mehrere Umstechungen von Blutungen auf der Uterusrückwand und dem linken Tubenstumpf. Appendektomie der reaktionslosen Appendix. Schluß der Bauchhöhle in Schichten.

28. 6. Mittags Schüttelfrost; Temp. 40,9, Puls 136, 0,2/20 Trypaflavin i. v.

29. 6. Anhaltendes Fieber. Trypaflavin.

1. 7. Draht gezogen, Wunde reaktionslos verheilt.

4. 7. Nach leichtem lytischen Abfall der Temperaturen abends wieder Anstieg. 0,2/20 Trypaflavin.

8. 7. Temperatur fällt stoffelförmig ab. Durchfälle nachlassend, Leib noch etwas gespannt. Meteorismus. Kohlecompetten.

11. 7. Temperatur wieder ansteigend, Leib etwas aufgetrieben; zunehmender Meteorismus! Peritonitis. Leibprießnitz, Kohlecompetten. Digipurat.

Nachmittags Singultus, gegen abend zunehmend. Trotz Lichtbogen und Hypophylin keine Peristaltik. Ileus.

12. 7. zunehmender Meteorismus; Puls beschleunigt, unregelmäßig, klein (Cardiaca). Nachmittags rapider Kräfteverfall. Abends Erbrechen fäkalenter Flüssigkeit.

13. 7. Exitus letalis gegen 12.30 Uhr.

Sektionsbefund: Bauchdeckenabszeß völlig entleert. Abszeßhöhle bis ins Cavum Retzii, nicht in Verbindung mit dem Peritoeum. Walnußgroße Pyosalpinx rechts mit abgeknickter Dünndarmschlinge (Ileum-

schlinge) fest verwachsen. Kleines Becken: Pelveoperitonitis, Parametritis, allgemeine Peritonitis; jauchiges Exsudat.

Nr. 16. (766/30) Frau E. B. 27 J. Cystoma ovarii dextri, Parovarialcyste, Appendicitis chr.

Periode ziemlich regelmäßig, alle 28/1—2 Tage. 3 Aborte gehabt (M. I—V, 1927, 1928, 1930).

Beschwerden: Zeitweise stechartige Schmerzen im Unterleib; Appetit schlecht; Stuhl angehalten, nur alle drei Tage.

Abdomen: Unterbauch durchschmerzhaft.

Genitale: Vulva, Vagina o. B. Portio zapfenförmig. Uterus hühnereigroß, antevertiertflektiert, weit nach links verdrängt durch einen über hühnereigroßen prall-cystischen Tumor des rechten Ovars. Linke Adnexe und Bandapparat o. B.

21. 5. 30. Operation: Abtragung des cystische Ovarialtumors und Refektion der rechten, nicht durchgängigen Tube. Webster-Baldy beiderseits, Appendektomie. Bildung eines Bauchdeckenabszesses. Spaltung.

14. 6. in ambulante Behandlung entlassen.

Nr. 17. (767/30) Frau M. L. 27 J. Descensus uteri et vaginae.

Einen Partus 1929. Seitdem Gefühl, als ob die Gebärmutter nach unten herausträte. Blase kontinent. Stuhlgang angehalten, Pat. ist immer müde und matt.

Pat. trägt seit vier Wochen Hodge-Pessar. Dadurch keine Besserung der Beschwerden.

Genitalbefund: Vordere und hintere Vaginalwand. Vulva mittelweit. Uterus hühnereigroß, antevertiertflektiert, sehr beweglich, beim Pressen mit der Portio unter die Interispinallinie tretend.

Pessar entfernt, am nächsten Tage liegt der Uterus retroflektiert.

22. 5. 30. In Avertin-Äther Mischnarkose: Pfannenstielquerchnitt durch die mäßig blut- und fettreichen Bauchdecken. Peritoneum o. B. Nach Zurückschieben der Därme wird der etwas über hühnereigroße Uterus im Douglas fühlbar. Er läßt sich leicht herausheben und fast eventrieren infolge des schlaffen, langen Bandapparates. Hebung und Antefixation nach Webster-Baldy. Appendektomie.

5. 6. Uterus in guter Lage; die Portio ist nur schwer mit dem Finger erreichbar.

Die Patientin wird beschwerdefrei entlassen.

Literatur.

Ashton: A Textbook on the practice of Gynaekology. 1916.

Bacon, C. S. (Chicago): Bericht über amerikanische geburtshilflich-gynäkologische Literatur mit Angabe ihrer Hauptquellen (Monatsschrift für Geburtshilfe u. Gynaekologie 1902).

Baldy, J. M.: A new operation for retrodisplacement of the uterus (The Gynaecological and Obstetrical Journal 1902).

— Retrodisplacement of the uterus and their treatment (New-York Medical Journal, 1903).

— Treatment of the uterine Retrodisplacement (Surgery, Gynaecology and obstetrics, 1909).

Berichte aus gynaekologischen Gesellschaften: Nordwestdeutsche Gesellschaft für Gynaekologie. (Zbl. Gynäk. 1927).

Berkeley u. Bonney: Textbook of gynecological Surgery. 1920.

Bertolini: Endoperitoneale Verkürzung der runden Bänder nach den Methoden von Webster-Franke, Menge-Stolz und Alfieri (Gynäkologische Rundschau, 1912).

Corning, Lehrbuch der topographischen Anatomie, 1931.

Cramer, Irmgard: Über traumatische Retroflexio uteri. Inaugural-dissertation, Bonn 1934.

Cramer, Heinr.: Über die Ursachen der Incarceration bei Retroflexio uteri gravidi. Münch. med. Wochschr. 1911.

Döderlein-Krönig: Operative Gynäkologie, 1912.

Eden-Lockyer: The new system of Gynaecology. 1917.

Ehrenfest: Quartalsbericht über die geburtshilfliche und gynäkologische Literatur der Vereinigten Staaten (Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, 1902).

Franke: Eine neue Methode der intraperitonealen Verkürzung der Ligamenta rotunda (Fixatio ligamenti rotundi retrouterina). (Zbl. Gynäk. 1909.)

— Zur retrouterinen Anheftung der Ligg. rotunda (Zbl. Gynäk. 1910).

— Zur Operation der Retroflexio und des Prolapsus uteri (Zbl. Gynäk. 1924).

— Zur chirurg. Behandlung der Retroflexio uteri (Zbl. Chir. 1931).

Franz: Gynäkologische Operationen, 1925.

Fritsch: Die Lageveränderungen und die Entzündungen der Gebärmutter (1885).

- Gerich: Zur operativen Behandlung der Retroflexio uteri (Med. Klinik 1929).
- Grechen: Über retrouterine Dopplung und Befestigung der Ligamenta rotunda zur Heilung der Rückwärtslagerung und Senkung (Zbl. Gynäk. 1915).
- Guggisberg: Die intraperitoneale Verkürzung der Ligamenta rotunda (Monatschr. Geb. Gyn. 1919).
- Halban: Gynäkologische Operationslehre. 1932.
- Hirsch: Zur Fixatio ligamenti rotundi retrouterina (Zbl. Gynäk. 1910).
- Jaschke, R. Th. v.: Lage- und Bewegungsanomalien des weiblichen Genitalapparates (in Handbuch der Gynäkologie, herausge. v. W. Stöckel, 1930).
- Kahr: Konervative Therapie der Frauenkrankheiten (Wien, 1934).
- Kienlin (Heynemann): Nachunterfuchung nach retrouteriner Anheftung der runden Mutterbänder (Baldy-Franke) (Zbl. Gynäk. 1930).
- Kritzler: Arbeiten über Prolapsoperationen (Referat: Med. Klinik, 1921).
- Küstner: Lehrbuch der Gynäkologie, 1912.
- Lagerfon (Minneapolis): Suspension des Uterus (Referat im Zbl. Gynäk. 1934).
- Menge-Opitz: Handbuch der Frauenheilkunde, 1920.
- Müll: Über die Webster-Baldy-Franke'sche Operation (Zbl. Gynäk. 1935).
- Nack, Clare T. C.: Lancet 1933 II.
- Offizieller Sitzungsbericht der Kölner Chirurgenvereinigung (Zbl. Chir. 1931).
- Otto: Erfahrungen mit der Retroflexionsoperation nach Baldy-Franke (Zbl. Gynäk. 1927).
- Runge: Blutung und Fluor.
- Schröder: Krankheiten der weibl. Geschlechtsorgane, 1886.
- Schultze, B. S.: Die Pathologie und Therapie der Lageveränderungen der Gebärmutter (1881).
- Sitzungsbericht der geburtshilflichen Gefellschaft zu Hamburg (Zbl. Gynäk. 1930).
- Stöckel: Beitrag zur operativen Behandlung der Lageveränderungen von Uterus und Scheide (Zbl. Gynäk. 1924).
- Handbuch der Gynäkologie, 1930.
- Lehrbuch der Gynäkologie, 1933.
- Stolz: Studien zur intraperitonealen Verkürzung der Ligg. rott. (Monatschrift Geb. Gyn. XXIX, 4).
- Stux: Sándor: Dynamische Gesichtspunkte bei der Korrektur der R.F. und die Naht der Rotunda auf die hintere Uterusgelenkfläche

(Referat, Berichte 1934).

Tandler: Pathologie und Therapie beim Weibe.

Veit: Handbuch der Gynäkologie I. Bd. 1907.

Webster, J. C.: A satisfactory operation for certain cases of retroversion of the Uterus (Journal of the American Medical Association, 1901).

Lebenslauf.

Ich, Kurt Gustav-Adolf Müll, wurde am 13. Januar 1912 in Witten a. d. Ruhr geboren als Sohn des Ingenieurs Olivier Müll und seiner Ehefrau Hedwig, geb. Gerdesmann. Die Grundschule besuchte ich ein Jahr in Witten und die restlichen drei Jahre in Iserlohn, wohin meine Eltern inzwischen verzogen waren. Nach neunjährigem Besuche des Realgymnasiums zu Iserlohn bestand ich dort im März 1931 die Reifeprüfung. Im Sommersemester 1931 begann ich mein medizinisches Studium an der Universität Freiburg. Das medizinische Vorexamen machte ich im Juli 1933 in Heidelberg. In den folgenden Semestern studierte ich in Berlin, Bonn, Freiburg und seit dem Sommersemester 1935 wieder in Bonn. Hier bestand ich im Herbst 1936 mein Staatsexamen.

